

Clozapine : règles de surveillance

Mémo pratique - France - règles actualisées en 2025

Cette fiche résume **les règles de surveillance obligatoires du risque hématologique** sous clozapine (Leponex et génériques), telles qu'actualisées par l'ANSM en 2025. Elle vise un usage pratique en établissement et en consultation.

Ce qui a changé

- Depuis 2025, la surveillance repose sur les **PNN** uniquement ; la surveillance du **nombre total de leucocytes** n'est plus requise.
- Le rythme est allégé après 1 an puis après 2 ans **si aucune neutropénie** n'a été observée.

À l'instauration

La clozapine n'est recommandée qu'avec des **PNN $\geq 1\,500/\text{mm}^3$** (ou **$\geq 1\,000/\text{mm}^3$** en cas de neutropénie bénigne ethnique confirmée).

1. Fréquence de surveillance des PNN

Période	Surveillance	Condition
Semaines 1 à 18	1 fois / semaine	Pour tout patient
Semaines 19 à 52	1 fois / mois	Jusqu'à la fin de la 1re année
Après 1 an	1 fois / 12 semaines	Uniquement s'il n'y a eu aucune neutropénie pendant la 1re année
Après 2 ans	1 fois / an	Uniquement s'il n'y a eu aucune neutropénie pendant les 2 premières années

2. Situations imposant une vigilance renforcée

- À chaque consultation, rappeler au patient de **contacter immédiatement son médecin** en cas de fièvre, angine, syndrome infectieux ou symptômes pseudo-grippaux.
- En cas de symptômes d'infection : **dosage immédiat des PNN**.
- Une surveillance supplémentaire peut être envisagée chez les patients âgés et en cas de traitement concomitant par **acide valproïque**, surtout à l'initiation.

3. Si les PNN baissent

- **PNN $1\,000$ à $1\,500/\text{mm}^3$** : contrôles **au moins 2 fois/semaine** jusqu'à stabilisation ou résolution, puis **surveillance mensuelle** tout au long du traitement.
- **PNN $< 1\,000/\text{mm}^3$** : **arrêt immédiat** de la clozapine, **pas de ré-exposition**, et surveillance médicale rapprochée.

4. À ne pas oublier en pratique

- L'ordonnance doit mentionner une **numération des neutrophiles datée**, avec résultats dans les limites usuelles.
- Le médecin tient à jour le **carnet de suivi**.
- Après **arrêt complet** du traitement : surveillance des PNN **chaque semaine pendant 4 semaines**.

Sources principales : ANSM, actualité du 28/03/2025 ; ANSM, information de sécurité et lettre aux professionnels du 08/09/2025 ; Base de données publique des médicaments (Clozapine).