

Médicaments "sensibles": règles pratiques de prescription

1. Durée de prescription

4 semaines Hypnotiques usuels : zopiclone, lormétazépam, nitrazépam / Mogadon. Zolpidem / Stilnox. Tianeptine / Stablon. Fentanyl transdermique / Durogesic. Morphiniques et apparentés : Skenan, OxyContin, Oxynorm, Abstral.	12 semaines Benzodiazépines anxiolytiques usuelles: Seresta, alprazolam, Temesta, prazépam, bromazépam. Clonazépam / Rivotril. Codéine et tramadol. Mélatonine LP 2 mg : Circadin et génériques chez les patients de 55 ans ou plus (13 semaines maxi).	6 mois Prégabaline / Lyrica et génériques.
--	---	--

2. Ordonnance sécurisée ou non

Catégorie / exemples	Durée max	Sécurisée
Benzodiazépines anxiolytiques usuelles Seresta, alprazolam, Temesta, prazépam, bromazépam	12 semaines	Non
Hypnotiques usuels zopiclone, lormétazépam, nitrazépam / Mogadon	4 semaines	Non
Zolpidem / Stilnox	4 semaines	Oui
Opioides faibles codéine, tramadol	12 semaines	Oui
Stupéfiants / opioides forts Durogesic / fentanyl patch, morphiniques usuels (Skenan, OxyContin, Oxynorm), Abstral	4 semaines	Oui
Mélatonine LP 2 mg / Circadin et génériques patients de 55 ans ou plus	13 semaines	Non
Slenyto (mélatonine LP pédiatrique) AMM pédiatrique, sur ordonnance uniquement	Pas de durée max réglementaire spécifique retrouvée	Non
Autres sur ordonnance sécurisée Tranxène 20 mg, Stablon, prégabaline / Lyrica, midazolam injectable	4 semaines à 6 mois	Oui

3. Cas particuliers à connaître

Rivotril (clonazépam)	Ordonnance sécurisée, durée max 12 semaines. Prescription initiale annuelle réservée aux spécialistes en neurologie ou en pédiatrie ; renouvellement non restreint.
Méthylphénidate Ritaline, Ritaline LP, Quasym LP...	Ordonnance sécurisée, durée max 4 semaines. Prescription initiale annuelle réservée aux spécialistes en neurologie, psychiatrie ou pédiatrie ; renouvellement non restreint.
Clozapine	Prescription réservée aux spécialistes en psychiatrie, neurologie ou gériatrie, avec mention sur l'ordonnance de la numération des neutrophiles datée et carnet de suivi tenu à jour.
Buccolam 10 mg solution buccale	Ordonnance sécurisée et prescription initiale annuelle réservée à certains spécialistes. La base publique 2026 affiche aussi une extension d'indication chez l'adulte ; je n'ai donc pas retenu la formule « > 18 ans = forcément hors AMM sous AAC » comme règle générale.
Néfopam / Acupan	PAS besoin d'ordonnance sécurisée et PAS de durée max spécifique sur la base officielle consultée pour ACUPAN 20 mg/2 mL injectable.
Mélatonine - Circadin / génériques	AMM : insomnie primaire chez les patients de 55 ans ou plus, en monothérapie, jusqu'à 13 semaines. Liste II. Pas de restriction spécifique de prescription initiale ou de renouvellement dans les sources officielles consultées.
Mélatonine - Slenyto	AMM : enfants/adolescents de 2 à 18 ans avec TSA et/ou troubles neurogénétiques ; et de 6 à 17 ans avec TDAH. Liste I, sur ordonnance uniquement. Pas de restriction officielle de prescription initiale/renouvellement dans l'AMM consultée ; réévaluation après environ 3 mois, suivi au moins semestriel, et pour le TDAH tentative d'arrêt au moins annuelle.

Sources principales consultées le 20/03/2026 : ANSM, Base de données publique des médicaments, EMA, Légifrance.