Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

AES - Soignant

Accident d'exposition au sang ou à un liquide biologique (piqûre, coupure, morsure, projection) chez tout professionnel : premiers gestes, avis médical dans les 4 h.

1 · Je sécurise

- **Arrêter le soin**, sécuriser l'aiguille (collecteur), se faire remplacer auprès de la personne.
- **Ne pas faire saigner** la plaie, ne pas presser, ne pas frotter.
- Prévenir l'IDE ou le cadre **tout de suite** : l'AES est une urgence médicale.
- Noter l'heure exacte de l'accident.

2 · J'observe et je mesure

- Type : piqûre, coupure, morsure, projection sur l'œil, la bouche ou une peau abîmée ?
- Matériel en cause (aiguille creuse, avec sang visible ?) et profondeur.
- **Identifier le patient source** (nom) : le médecin recherchera son statut VIH, VHB, VHC.
- Préciser **son statut vaccinal hépatite B** (et le taux d'anticorps anti-HBs s'il est connu).

3 · J'agis

- Peau : **laver à l'eau et au savon**, rincer, puis antiseptique : Dakin (hypochlorite) ou povidone iodée, 5 min.
- Œil, bouche : **rincer abondamment au moins 5 min** (sérum physiologique ou eau).
- Appeler le **référent AES / les urgences** (n° affiché dans le service) : **avis médical dans les 4 h**.
- **Déclarer l'accident du travail** le jour même (procédure de l'établissement).

Je ne fais pas

- Faire saigner, presser, frotter ou brosser la plaie.
- Retarder le lavage pour chercher un produit : eau + savon d'abord.
- Attendre la fin du service ou le lendemain pour l'avis médical.
- Recapuchonner une aiguille (cause fréquente d'AES).

J'alerte

Appel 15 (ou urgences) si :

- Le référent AES et les urgences ne sont pas joignables rapidement.
- Malaise du professionnel exposé, plaie profonde qui saigne abondamment.
- Morsure profonde ou délabrante.

Délais à retenir :

- **Avis médical idéalement dans les 4 h** : un traitement préventif (TPE) se décide vite.
- **Au-delà de 48 h, pas de TPE** : ne jamais « attendre de voir ».
- Exposition la nuit ou le week-end : urgences de l'hôpital de référence, sans attendre le lundi.

Je surveille et je trace

- Tracer : heure, circonstances, gestes faits, patient source, personnes prévenues.
- Suivre le traitement et les bilans prescrits ; ne pas interrompre un traitement post-exposition.
- Signaler l'AES pour analyse (prévention, matériel sécurisé).

Mention de sécurité

Ne pas faire saigner, laver, antiseptique ou rinçage 5 min, puis avis médical dans les 4 h (TPE possible jusqu'à 48 h). Déclarer l'accident du travail.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : HAS, Traitement préventif post-exposition au VIH (juillet 2024) ; INRS/GERES, conduite à tenir en cas d'AES ; Code du travail, arrêté du 10/07/2013 (prévention des risques biologiques, objets perforants) ; DOTR, protocole IDE « AES – Biologie et orientation ».