Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Agitation / crise de comportement

Agitation, agressivité, auto- ou hétéro-agression (âgé, handicap, autisme, enfant) : sécuriser, chercher une cause, alerter.

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · violence incontrôlable, blessé, arme, mise en danger grave ; agitation avec gêne respiratoire ou trouble de conscience.

Protocole individuel / PAI : plan de crise individuel : l'appliquer en premier (signes d'alerte, ce qui apaise, espace calme, qui appeler).

1 · Je sécurise

- **Garder une distance de sécurité**, ne pas bloquer la sortie, une seule personne parle, voix calme.
- **Mettre les autres à l'abri** ; écarter les objets dangereux ; demander du renfort.
- Réduire bruit, lumière, nombre de personnes ; ne pas contredire ni hausser le ton.
- Ne jamais rester seul face à une personne violente.

2 · J'observe et je mesure

- Changement **brutal** ? Inhabituel ?
- **Douleur** (dents, ventre, appareillage) ?
- **Globe** (n'urine pas), **pas de selles**, fièvre, toux ?
- Diabète : **glycémie** (AS/AP) ; < 0,70 g/L → « Hypoglycémie ».
- Médicament nouveau ou arrêté ? Chute ?

3 · J'agis

- Proposer l'**activité ou l'objet qui apaise** (plan de crise) ; espace calme si prévu.
- Prévenir l'**IDE** : elle recherche une cause physique et appelle le médecin.
- « Si besoin » : **seulement après validation de l'IDE ou du médecin**.
- Après : calme, vérifier les blessures.

Je ne fais pas

- **Attacher ou contenir** sans prescription médicale (contention = prescription + IDE).
- Donner un psychotrope « si besoin » de sa propre initiative ou sur l'avis d'un non-soignant.
- Isoler sous clé, punir, menacer.
- Conclure « c'est psychiatrique » sans avoir cherché une cause physique.

J'alerte

Appel 15 immédiat si :

- **Danger immédiat** non maîtrisable (17 si arme).
- Agitation avec gêne respiratoire, convulsion, somnolence.
- Blessure grave, intoxication, tentative de suicide.
- Signe de gravité et IDE non joignable.

J'appelle l'IDE (à défaut : médecin d'astreinte ou DOTR) si :

- **Confusion ou changement brutal** de comportement.
- Douleur, **fièvre** (> 39 °C = sans délai), globe, constipation, médicament récent.
- Avant tout traitement « si besoin ».
- Crise inhabituelle ou plus longue que d'habitude, malgré le plan de crise.

Je surveille et je trace

- Tracer : déclencheur, comportement, durée, mesures, effets, blessures.
- Traitement donné : validé par qui, heure, effet, somnolence.
- Signaler pour réviser le plan de crise ; échange d'équipe.

Mention de sécurité

Sécurité d'abord, puis chercher la cause : douleur, globe, constipation, fièvre, hypoglycémie, médicament. Ni contention ni « si besoin » sans prescription et validation IDE/médecin.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : ARS IDF/STARAQS, Situations d'urgence ESMS handicap, fiche Agitation (2023) ; ARS IDF/SGGIF, fiches urgence EHPAD, Agitation (2016) ; Urg'ARA, EHPUR (MAJ 2025) ; TA Dijon 25/01/2024 n° 2000998 et CAA Lyon 2026 (via FNASFO 2026) ; arrêté du 26/06/2026, art. 4 II (contention) ; DOTR, protocole « si besoin ».

Réf. DOTR-AS-AGIT | Version 2.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature