Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Réaction allergique : de l'urticaire à l'anaphylaxie

Apparition brutale après un aliment, un médicament, une piqûre d'insecte ou le latex. Tout public ; enfant : appliquer le PAI.

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · lèvres, langue ou gorge qui gonflent, voix changée, gêne pour respirer ou avaler, malaise, perte de connaissance ; éruption avec vomissements.

Protocole individuel / PAI : si un **auto-injecteur d'adrénaline nominatif** (Anapen, EpiPen, Jext) est prévu par le PAI ou le protocole individuel et que ses critères sont présents : l'injecter **immédiatement**, face antéro-latérale de la cuisse, **même à travers les vêtements**, noter l'heure, puis appeler le 15. 2e stylo après 5 à 15 min seulement si le PAI le prévoit ou sur consigne du 15.

1 · Je sécurise

- Rester avec la personne ; **arrêter le contact** avec la cause (repas, médicament, latex, insecte).
- Malaise : **allonger, jambes surélevées** ; gêne respiratoire : **assis** ; ne répond pas mais respire : **PLS**.
- **PAI ou protocole individuel ?** Le sortir et l'appliquer (bandeau violet).

2 · J'observe et je mesure

- **Niveau 1** : boutons, rougeurs ou gonflement **localisés**, qui grattent.
- **Niveau 2** : éruption étendue (visage, corps) ou gonflement du cou, **sans** gêne respiratoire.
- **Niveau 3 = anaphylaxie** : gorge, langue, lèvres gonflées, voix changée, gêne respiratoire, peau bleue, malaise, vomissements.
- **Niveau 4** : perte de connaissance, respire. **Niveau 5** : arrêt cardio-respiratoire.
- TA, pouls, SpO2, FR ; heure de début ; cause probable.

3 · J'agis

- Niveau 1 : IDE et surveillance rapprochée (la réaction peut s'étendre).
- Niveau 2 : IDE sans délai ; injoignable → 15.
- Niveaux 3-4 : **15 immédiatement**, puis IDE ; auto-injecteur si prévu (bandeau violet).
- Niveau 5 : massage + DSA (protocole « Arrêt cardio-respiratoire »).

Je ne fais pas

- Remettre debout ou faire marcher après un malaise.
- Donner un antihistaminique ou un corticoïde « à la place » de l'adrénaline : ils ne la remplacent pas.
- Donner un « si besoin » sans validation de l'IDE (protocole « si besoin » DOTR).

J'alerte

Appel 15 immédiat si :

- Niveau 3, 4 ou 5 ; **auto-injecteur utilisé** : toujours.
- Réaction qui s'étend vite, gonflement du visage qui progresse.

J'appelle l'IDE (à défaut : médecin d'astreinte ou DOTR) si :

- Niveau 1 ; niveau 2 sans délai (injoignable → 15).
- Après tout appel au 15.

Je surveille et je trace

- En continu : respiration, voix, gonflement, conscience, couleur de la peau.
- Après adrénaline ou anaphylaxie : surveillance à l'hôpital décidée par le 15 (rechute possible).
- Tracer : heure, cause supposée, niveau, gestes, heure d'injection ; signaler l'allergie (dossier, DLU).

Mention de sécurité

Gêne pour respirer ou avaler, malaise, gonflement de la gorge = anaphylaxie : adrénaline du PAI sans attendre, puis 15.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Références : ARS IDF/STARAQS, guide ESMS handicap, fiche 19 « Allergie » (graduation en 5 niveaux, 2023) ; SFMU/SFA/GFRUP/SP2A, RFE Anaphylaxie, Ann Fr Med Urgence 2016;6:342-64 ; OMéDIT IDF/ARS IDF, Que dit la loi sur la PECM en ESMS handicap (janv. 2025) ; RCP Anapen 300 (MAJ 18/09/2026), EpiPen 0,30 (MAJ 14/11/2025).

Réf. DOTR-AS-ALLERG | Version 1.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.