Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Brûlure

Liquide chaud, flamme, objet chaud, produit chimique, électricité. Tout public ; enfant : avis médical systématique.

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · brûlure étendue ou profonde, du visage ou du cou, électrique ou chimique, fumée inhalée, gêne respiratoire, malaise.

1 · Je sécurise

- Supprimer la cause ; électricité : **couper le courant avant de toucher** la personne.
- **Refroidir tout de suite** : eau courante tempérée (≈ 15 °C), faible pression, **10 min au moins, 20 min idéalement**.
- Pendant l'arrosage, retirer vêtements **non collés** et bijoux.
- Grande surface (> 15 paumes) : arroser selon le 15, **couvrir le reste du corps** (hypothermie).

2 · J'observe et je mesure

- Heure et cause (arroser après 30 min n'a plus d'intérêt).
- Cloque(s) plus grandes que **la moitié de la paume** de la personne ? Peau blanche, noire ou cartonnée ?
- Siège : visage, cou, mains, articulations, organes génitaux, autour d'un orifice ; tour complet d'un membre ?
- Constantes, **température** ; douleur (EN, Algoplus, échelle habituelle).

3 · J'agis

- Brûlure grave : **15 dès le début de l'arrosage** ; ensuite allonger (assis si gêne respiratoire).
- Brûlure simple : arroser jusqu'à disparition de la douleur ; couvrir d'un **film alimentaire** ou d'une compresse stérile.
- Produit chimique : se protéger, rincer longuement ; œil : rincer sans couler vers l'autre œil ; garder l'emballage.
- Prévenir l'IDE : soin, **vaccination antitétanique** à vérifier ; photo au médecin via **HEALPHI** si demandé.

Je ne fais pas

- **Percer les cloques**, arracher un vêtement collé à la peau.
- Appliquer un corps gras, une crème ou un produit sans avis de l'IDE ou du médecin.
- Donner un antalgique sans validation de l'IDE (protocole « Paracétamol – Douleur et/ou fièvre »).

J'alerte

Appel 15 immédiat si :

- Cloques > moitié de la paume, peau blanche ou noire, visage, cou, mains, articulations, périnée, tour d'un membre.
- Électrique, chimique, inhalation de fumée ou de vapeurs, gêne respiratoire.
- Enfant : rougeur étendue (type coup de soleil généralisé).

J'appelle l'IDE (à défaut : médecin d'astreinte ou DOTR) si :

- **Toute** brûlure, même simple : soin, vaccination antitétanique, avis médical.
- Enfant : avis médical systématique ; douleur EN > 5 ou Algoplus > 3 malgré l'arrosage.

Je surveille et je trace

- Douleur, aspect, cloques ; **température** si grande surface.
- Jours suivants : fièvre, rougeur qui s'étend, chaleur, gonflement → IDE.
- Tracer : heure, cause, étendue, siège, durée d'arrosage ; déclarer l'événement indésirable.

Mention de sécurité

Refroidir d'abord : eau courante tempérée 10 à 20 min, dans les 30 min. Ne pas percer les cloques, rien de gras ; brûlure grave = 15.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : DGSCGC, Recommandations PSC1, fiche 02PR07 « Brûlures » (MAJ 12/2022, éd. 2024) ; ARS IDF/STARAQS, guide ESMS handicap fiche 17 « Brûlure » (2023) ; arrêté du 26/06/2026 (actes AS/AP/AES).

Réf. DOTR-AS-BRUL | Version 1.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature