Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Constipation

Arrêt ou ralentissement des selles : surveiller, hydrater, mobiliser, repérer le fécalome et l'occlusion. Adulte et enfant (IME : PAI d'abord).

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · ventre gonflé, dur et très douloureux avec vomissements ou arrêt des gaz ; malaise, sueurs, trouble de conscience.

1 · Je sécurise

- Installer confortablement ; ne pas laisser seule une personne qui a très mal au ventre.
- Vomissements : position assise ou **PLS**, rien à boire en attendant l'IDE.
- Non communicant : changement de comportement, cris à la selle, refus de manger = douleur possible.

2 · J'observe et je mesure

- **Grille des selles** : date de la dernière selle, aspect (échelle de Bristol).
- Ventre gonflé, dur, douloureux ? Gaz ? Nausées, vomissements ?
- **Diarrhée en filet**, agitation, urines bloquées : **fécalome possible**.
- Boissons des 24 h, mobilité, traitement constipant (morphinique...).

3 · J'agis

- Faire boire souvent, **sauf restriction hydrique** (eau gélifiée si troubles de déglutition).
- Mobiliser selon les capacités ; toilettes à heure fixe, après un repas.
- Fruits, légumes, pain complet si le régime et la texture le permettent.
- **Laxatif « si besoin » prescrit** : seulement **après validation de l'IDE** (aide à la prise AS/AP).

Je ne fais pas

- Lavement, extraction de selles, toucher rectal : gestes réservés à l'IDE.
- Donner un laxatif de sa propre initiative.
- Traiter une diarrhée en filet comme une simple diarrhée chez une personne constipée.
- Faire manger ou boire une personne qui vomit ou dont le ventre est dur.

J'alerte

Appel 15 immédiat si :

- Ventre gonflé, dur ou très douloureux **avec vomissements** ou **arrêt des gaz** (occlusion possible).
- Vomissements d'aspect fécal ; sueurs, marbrures ou malaise avec la douleur.

J'appelle l'IDE (à défaut : médecin d'astreinte ou DOTR) si :

- **Pas de selle depuis 3 jours** (ou au-delà du rythme habituel) malgré les mesures simples.
- Fécalome suspecté ; sang dans les selles ; douleur ou ballonnement nouveaux.
- Enfant (IME) : selon le PAI ; douleur, refus de manger, vomissements.

Je surveille et je trace

- Remplir la **grille des selles chaque jour** (date, aspect, quantité) : base de l'avis de l'IDE.
- Tracer boissons, douleurs, vomissements, mesures prises, IDE prévenue et consignes.
- Après un laxatif validé : tracer l'heure et le résultat ; pas d'effet → le dire à l'IDE.

Mention de sécurité

Une constipation récente, douloureuse ou avec vomissements n'est jamais banale. Pas de laxatif sans prescription ni validation de l'IDE.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : ARS IDF/SGGIF, 20 fiches urgence EHPAD (2016) ; ARS IDF/STARAQS, fiches urgence ESMS handicap (2023) ; arrêté du 26/06/2026 (actes AS/AP/AES, art. 2) ; protocole DOTR Aide à la prise des traitements si besoin.

Réf. DOTR-AS-CONST | Version 2.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature