Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Propos ou crise suicidaire

La personne parle de mourir ou de se tuer, ou fait un geste inquiétant (adulte, adolescent en IME, personne âgée) : rester avec elle, écouter, alerter.

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · geste suicidaire en cours ou réalisé (blessure, prise de médicaments, pendaison), projet avec moyen à portée, personne qui ne répond pas.

1 · Je sécurise

- **Ne pas laisser seule** la personne : rester avec elle ou faire venir un collègue.
- **Éloigner les moyens** : médicaments, objets coupants, cordons, ceintures ; accès aux fenêtres et balcons.
- Geste réalisé : premiers secours, **15**, garder emballages et objets.

2 · J'observe et je mesure

- **Poser la question directement** : « Pensez-vous à vous suicider ? » En parler n'augmente pas le risque.
- A-t-elle un **projet** (comment, quand) ? Le **moyen** est-il à portée ?
- Signes : idées de mort, adieux, dons d'objets, repli, calme soudain après une crise, alcool.
- Non communicant : changement brutal de comportement ; adolescent (IME) : harcèlement, rupture, conflit.

3 · J'agis

- **Écouter** sans juger ; parler calmement.
- Alerter **IDE**, **médecin** (astreinte, DOTR) et **cadre** tout de suite, même si elle se calme ; IME : parents par le cadre.
- **3114** : prévention du suicide, 24 h/24, gratuit (personne, proches, équipe).
- Tentative de suicide : signalement par la direction (fiche socle « Qui signale quoi, à qui ? »).

Je ne fais pas

- Laisser seule, même quelques minutes, une personne qui a un projet.
- Minimiser (« ce n'est pas sérieux »), faire la morale.
- Promettre de garder le secret.
- Donner un traitement « si besoin » sans validation de l'IDE (ou du médecin d'astreinte).

J'alerte

Appel 15 immédiat si :

- Geste suicidaire réalisé ou en cours, intoxication, blessure.
- Projet précis avec moyen à portée, ou personne qui veut partir pour passer à l'acte.
- Agitation avec danger pour elle ou les autres ; arme : aussi le **17**.

J'appelle l'IDE (à défaut : médecin d'astreinte ou DOTR) si :

- **Tout propos suicidaire**, même dit « en passant » ou en plaisantant.
- Idées de mort, désespoir, repli, refus de manger ou des traitements.
- Changement brutal de comportement, automutilation nouvelle.

Je surveille et je trace

- Tracer **les mots exacts**, entre guillemets, l'heure, le contexte, qui a été prévenu.
- Surveillance selon les consignes du médecin ; transmettre à chaque relève.
- Après un geste : temps d'échange et soutien pour l'équipe et les autres résidents.

Mention de sécurité

Tout propos suicidaire est pris au sérieux : on reste avec la personne, on pose la question, on éloigne les moyens, on alerte. Danger immédiat : 15. Conseil : 3114.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : Ministère de la Santé, Le numéro national de prévention du suicide, 3114 (santé.fr, MAJ 07/2026) ; santé.fr, Que faire face à une crise suicidaire ? (2024, MAJ 07/2026) ; PSSM France, Mieux aider une personne ayant des idées suicidaires (2023) ; ASSURE IDF, fiche Crise suicidaire (2023) ; arrêté du 28/12/2016, art. 1, 7°.

Réf. DOTR-AS-SUICID | Version 1.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature