Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Fiche 0 — Signes de gravité : quand appeler le 15, quand appeler l'IDE

Fiche de référence de la collection : 3 niveaux, mêmes seuils dans toutes les fiches. Adulte ; repères enfant (IME) dans « Qui j'appelle ».

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · un seul signe du niveau 1 suffit : n'importe qui appelle le 15, jour et nuit, sans chercher l'IDE.

Niveau 1 · Urgence vitale → 15

- **Ne répond pas**, ne respire pas ou respire anormalement → RCP + DSA.
- **Détresse respiratoire** (lutte, bruits, lèvres bleues, ne peut plus parler) ; **hémorragie abondante**.
- **Convulsion > 5 min** ou répétée sans reprise de conscience ; **trouble de conscience brutal**.
- **Douleur thoracique** ; **signes d'AVC** (visage, bras, parole) même s'ils régressent ; **purpura + fièvre**.

Niveau 2 · Chiffres d'alerte

- Pouls **< 50 ou > 120/min** ; PAS **< 100 ou > 200 mmHg** (aux **deux bras**).
- FR **< 10 ou > 25/min** ; SpO2 **< 90 %** (insuffisant respiratoire chronique : cible du médecin).
- T° **> 39 ou < 36 °C** ; glycémie (AS/AP) **< 0,70 g/L** non corrigée par le resucrage ou **> 3 g/L**.
- **EN > 5 ou Algoplus > 3** ; sueurs, marbrures, somnolence inhabituelle, confusion brutale.

J'agis en attendant les secours

- Je reste auprès de la personne ; un collègue appelle et apporte le DSA.
- Inconsciente qui respire : **PLS**. Ne respire pas normalement : **RCP + DSA**.
- Protocole individuel / PAI (épilepsie, allergie, asthme) : je l'applique.
- Message au 15 : fiche « Appeler le 15 : le bon message (SAED) ». **DLU** prêt ; la nuit, porte ouverte.

Je ne fais pas

- Chercher l'IDE ou lire les protocoles avant d'appeler le 15 devant un signe du niveau 1.
- Attendre tous les paramètres si la situation est manifestement grave.
- Faire boire, manger ou prendre un médicament à une personne somnolente ou confuse.
- Attribuer au « comportement » un changement brutal chez une personne non communicante.

Qui j'appelle, jour et nuit

Niveau 1 → 15 (ou 112), par n'importe qui :

- J'appelle **moi-même** le 15, sans passer par l'IDE ni le cadre.
- Puis je préviens l'IDE (ou d'astreinte) et le cadre d'astreinte.
- DOTR **n'est pas un service d'urgence**.

Niveau 2 → IDE sans délai ; IDE non joignable → 15 :

- Jour : IDE de l'établissement ; nuit : IDE de nuit ou d'astreinte. **Pas de réponse immédiate → 15.**
- Handicap : **changement brutal de comportement + un signe de gravité** = niveau 2.
- Enfant (IME) : PAI d'abord ; geignement, tirage, enfant mou ou inconsolable ; **< 3 mois + fièvre : avis urgent**.

Niveau 3 · À signaler dans l'heure

- T° **≥ 38 °C** (personne âgée : **≥ 37,8 °C** ou + 1,1 °C sur son habituel) ; douleur nouvelle.
- Changement de comportement **sans** signe de gravité ; glycémie **2 à 3 g/L** chez un diabétique.
- Je recontrôle et je trace : heure, chiffres, qui j'ai appelé, consignes reçues.

La règle d'or

Dans le doute entre deux niveaux, je choisis le plus grave. Urgence vitale : le 15 d'abord, les protocoles ensuite.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : ARS IDF/SGGIF, IDE et AS en EHPAD : CAT en situation d'urgence, fiche 0 (2016) ; ARS IDF/STARAQS, situations d'urgence en ESMS handicap, fiche 0 (2023) ; ASSURE IDF, fiches A et D (2023) ; High KP et al., IDSA, fièvre du sujet âgé en institution (2009) ; arrêté du 26/06/2026 (actes AS/AP/AES).

Réf. DOTR-AS-FICHE0 | Version 2.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature