Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Diarrhée

Au moins 3 selles liquides en 24 h : hydrater, repérer la déshydratation, éviter la transmission. Adulte et enfant (IME : PAI d'abord).

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · ne répond pas normalement, somnolence inhabituelle, marbrures, malaise ; sang abondant dans les selles.

1 · Je sécurise

- **Précautions contact** : gants et tablier pour le change ; matériel dédié si possible.
- **Hygiène des mains** : lavage au savon si souillées, puis friction hydro-alcoolique.
- Change rapide et soins de peau : prévenir les irritations et les escarres.

2 · J'observe et je mesure

- Nombre de selles en 24 h, aspect : **sang, glaires** ? Vomissements ? Douleur du ventre ?
- Température ; pouls, TA ; boit-elle ? Urines rares ou foncées ?
- **Déshydratation** : bouche et langue sèches, somnolence, confusion, malaise au lever.
- Antibiotique récent ? Laxatif ? Constipation connue (diarrhée en filet = **fécalome**) ?

3 · J'agis

- Faire boire **souvent, par petites quantités** ; eau gélifiée si troubles de déglutition.
- Soluté de réhydratation orale (SRO) **s'il est prescrit** ; alimentation légère selon l'appétit.
- Antidiarrhéique « si besoin » : seulement **après validation de l'IDE** (aide à la prise AS/AP).
- Autres cas dans le service : **prévenir l'IDE et le cadre le jour même**.

Je ne fais pas

- Donner un antidiarrhéique de sa propre initiative.
- Supprimer les boissons par peur des selles.
- Partager toilettes, chaise percée ou matériel sans nettoyage-désinfection.
- Faire boire une personne somnolente ou qui fait des fausses routes.

J'alerte

Appel 15 immédiat si :

- Somnolence inhabituelle, confusion brutale, malaise, marbrures.
- Sang abondant dans les selles ; PAS < 100 mmHg ou pouls > 120/min si l'IDE n'est pas joignable.

J'appelle l'IDE (à défaut : médecin d'astreinte ou DOTR) si :

- **Sang dans les selles ou fièvre** ; douleur du ventre ; vomissements associés.
- Signes de déshydratation, ne boit pas, urines rares ; diarrhée après antibiotique.
- Diarrhée qui ne diminue pas en 24 h, ou fécalome suspecté.
- Enfant (IME) : selon le PAI ; enfant mou, refuse de boire, ne mouille plus ses couches.

Je surveille et je trace

- Tracer chaque selle (heure, aspect), boissons, urines, température, IDE prévenue.
- Lister les cas : **5 cas chez les résidents en 4 jours = signalement** (fiche « Épidémie d'IRA ou de GEA en ESMS »).

Mention de sécurité

Dès le premier cas : précautions contact et hygiène des mains. Le danger, c'est la déshydratation, surtout chez la personne âgée et l'enfant.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : ARS IDF/SGGIF, 20 fiches urgence EHPAD (2016) ; ASSURE IDF, fiche Diarrhées (2023) ; ARS ARA, procédure GEA en ESMS (09/2025) ; fiche socle DOTR Épidémie d'IRA ou de GEA en ESMS (10/2026) ; arrêté du 26/06/2026 (actes AS/AP/AES).

Réf. DOTR-AS-DIARR | Version 2.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature