Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Douleur

Douleur exprimée, observée ou suspectée : repérer, mesurer avec la bonne échelle, soulager sans médicament, alerter. Personne âgée, handicap, enfant.

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · douleur dans la poitrine ; mal de tête brutal et intense ; ventre dur avec vomissements ; douleur avec difficulté à respirer, sueurs ou malaise.

1 · Je sécurise

- Installer dans la position la moins douloureuse ; ne pas mobiliser une zone déformée ou très douloureuse.
- Rester auprès de la personne, parler calmement.
- Protocole individuel ou PAI douleur : l'appliquer.
- Ne parle pas : **un changement de comportement** (cris, repli, agitation, refus) = douleur possible.

2 · J'observe et je mesure

- Où ? Depuis quand ? Nouvelle ou habituelle ? Au repos, au toucher, au soin ?
- Personne qui communique : **EN de 0 à 10** (0 = pas mal, 10 = pire douleur).
- Non communicant : **Algoplus** (âgé ; **≥ 2 = douleur**), DOLOPLUS ; handicap : **EDAAP, GED-DI** ; enfant : **FLACC**.
- Fièvre, vomissements, ventre dur, chute récente, membre déformé ? Pouls, TA, T°.

3 · J'agis

- Coter avec l'échelle du plan de soins (AS/AP ou avec l'IDE) ; l'éducateur décrit ce qu'il observe.
- Chercher une cause simple : position, appareillage, chaussures, change, constipation, dents.
- Antalgique prescrit « si besoin » : appeler l'IDE, qui décide ; aide à la prise **après sa validation**.
- Recoter avec **la même échelle** au délai fixé par l'IDE.

Je ne fais pas

- Donner un antalgique de sa propre initiative, ou celui d'un autre résident.
- Masser ou mobiliser une zone déformée, gonflée ou très douloureuse.
- Banaliser : « il a toujours mal », « c'est du comportement ».
- Faire manger ou boire une personne qui a très mal au ventre.

J'alerte

Appel 15 immédiat si :

- Douleur dans la **poitrine** ; douleur avec essoufflement, sueurs ou malaise.
- Mal de tête **brutal et intense**, ou avec trouble de la parole ou faiblesse d'un côté.
- Ventre dur et très douloureux, avec vomissements.

J'appelle l'IDE (à défaut : médecin d'astreinte ou DOTR) si :

- **EN > 5 ou Algoplus > 3** : sans délai ; IDE non joignable → 15.
- Douleur nouvelle ou changement de comportement : dans l'heure.
- Douleur non soulagée après l'antalgique validé.
- Douleur après une chute : protocole « Chute ».

Je surveille et je trace

- Tracer : échelle utilisée, score, localisation, heure, mesures prises, effet.
- Tracer qui a validé l'antalgique et à quelle heure.
- Recours répétés au « si besoin » : signaler pour réévaluation médicale (DOTR).

Mention de sécurité

Une douleur inhabituelle n'est jamais banale. Pas d'antalgique sans validation de l'IDE (protocole DOTR Aide à la prise des traitements si besoin).

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : ASSURE IDF, fiche Résident douloureux (2023) ; ARS IDF/SGGIF (2016) ; ARS IDF/STARAQS, ESMS handicap (2023) ; échelle Algoplus (Rat et al., 2011) ; arrêté du 26/06/2026 (actes AS/AP, art. 2 B) ; L.313-26 CASF.

Réf. DOTR-AS-DOUL | Version 2.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature