Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Douleur abdominale

Mal au ventre nouveau ou inhabituel, exprimé ou repéré par un changement de comportement. EHPAD, MAS-FAM, IME.

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · ventre dur ou très gonflé, vomissements de sang ou « marc de café », selles noires ou sang abondant, malaise, sueurs, marbrures, douleur dans la poitrine.

1 · Je sécurise

- Rester près de la personne ; l'installer dans la position qui la soulage.
- **Ne rien donner à manger ni à boire** avant l'avis de l'IDE ou du médecin.
- Vomit ou somnolente : sur le côté ; PLS si elle ne répond pas normalement.

2 · J'observe et je mesure

- TA, pouls, SpO2, FR, **température** ; diabétique : **glycémie capillaire (AS/AP)**.
- Douleur : EN ; non communicant : **Algoplus** ou échelle habituelle (EDAAP, GED-DI, FLACC).
- Ventre dur, gonflé ? Bosse inhabituelle (aine, nombril) ? Vomissements : aspect, sang ?
- **Dernières selles et gaz** ; diarrhée, sang ; urines : protections sèches, brûlures, urines rouges ?
- Non communicant, enfant : cris, agitation ou repli, refus alimentaire, comportement changé.

3 · J'agis

- Préparer pour l'IDE ou le 15 : constantes, dernières selles, traitements (anticoagulant, AINS, antibiotique récent).
- Protocole individuel pour douleurs récidivantes : prévenir l'IDE, qui valide le « si besoin ».
- Bas-ventre tendu ou pas d'urines → protocole « Peu ou pas d'urines / globe vésical ».
- Sans gravité : constipation → protocole « Constipation » ; vomissements → « Vomissements ».

Je ne fais pas

- Donner un **laxatif** ou un suppositoire (dangereux en cas d'occlusion).
- Donner un antalgique ou un antispasmodique sans validation de l'IDE.
- Mettre un changement de comportement sur le compte du handicap ou de la démence sans chercher une douleur.

J'alerte

Appel 15 immédiat si :

- Ventre dur, gonflé ou très douloureux ; vomissements répétés ou de sang ; selles noires ou sang.
- **Ni selles ni gaz** avec ventre gonflé ou vomissements.
- Malaise, marbrures, sueurs ; douleur dans la poitrine associée.

J'appelle l'IDE (à défaut : médecin d'astreinte ou DOTR) si :

- **Toute** douleur abdominale nouvelle, même sans signe de gravité.
- EN > 5 ou Algoplus > 3, fièvre ≥ 38 °C, pouls > 120, PAS < 100 mmHg : IDE sans délai ; injoignable → 15.

Je surveille et je trace

- Douleur (même échelle), vomissements, selles, gaz, urines, température : noter les heures.
- Douleur qui persiste ou revient : avis médical dans la journée (IDE → médecin ou DOTR).
- Tracer : constatations, constantes, gestes, qui a été prévenu.

Mention de sécurité

Ventre dur, vomissements de sang, malaise = 15. Ni nourriture, ni laxatif, ni antalgique avant l'avis de l'IDE.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : ARS IDF/SGGIF, fiches urgence EHPAD n° 17 (2016) ; ARS IDF/STARAQS, guide ESMS handicap fiches 0 et 20 (2023) ; ASSURE IDF, fiche 15 (2023) ; protocole DOTR Aide à la prise des traitements si besoin ; arrêté du 26/06/2026 (actes AS/AP/AES).

Réf. DOTR-AS-ABDO | Version 1.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature