Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Douleur thoracique

Douleur, serrement ou poids dans la poitrine, parfois vers bras, cou, mâchoire, dos ou haut du ventre. Tout public, surtout adulte.

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · toute douleur dans la poitrine, **même modérée ou passée** ; avec sueurs, pâleur, essoufflement ou malaise ; ne répond plus.

1 · Je sécurise

- **Appeler le 15 tout de suite** (ou faire appeler), puis l'IDE.
- **Repos strict** : aucun effort, ne pas faire marcher, même jusqu'aux toilettes.
- Position qui soulage, souvent **demi-assise** ; desserrer les vêtements.
- Ne pas laisser seule ; faire apporter le **DSA**.

2 · J'observe et je mesure

- Heure de début ; douleur qui serre, pèse ou brûle ; vers bras, cou, mâchoire, dos ?
- Sueurs, pâleur, essoufflement, nausées, palpitations, malaise, angoisse ?
- TA aux deux bras, pouls, SpO2, FR ; **glycémie capillaire (AS/AP)**.
- Non communicant : **Algoplus** ou échelle habituelle ; changement brutal de comportement.
- **Anticoagulant ou antiagrégant ?** Antécédent cardiaque ? Chute récente ?

3 · J'agis

- Au 15 : heure de début, description, constantes, glycémie, traitements ; **ne pas raccrocher sans accord**.
- Préparer DLU, ordonnances, ECG antérieur, directives anticipées ou niveau de soins.
- Nuit : ouvrir la porte, éclairer l'accès, envoyer quelqu'un accueillir les secours.

Je ne fais pas

- Donner un médicament sans consigne du 15 ; **trinitrine** (Natispray) : par l'IDE, sur accord du 15.
- Conclure à « l'angoisse » ou attendre que ça passe.
- Retarder le 15 pour joindre d'abord l'IDE, le médecin ou la famille.

J'alerte

Appel 15 immédiat si :

- **Dans tous les cas, d'emblée**, même si la douleur a cédé ou semble liée à une chute.
- Ne répond plus : PLS s'il respire ; sinon massage + DSA (protocole « Arrêt cardio-respiratoire »).

J'appelle l'IDE (à défaut : médecin d'astreinte ou DOTR) si :

- Toujours, **juste après le 15** : l'IDE fait l'ECG et prépare le transfert.
- Nuit sans IDE : IDE ou médecin d'astreinte, après le 15.

Je surveille et je trace

- En continu jusqu'aux secours : conscience, respiration, pouls, TA, SpO2, douleur ; aggravation → rappeler le 15.
- Tracer : heure de début, constantes, appels, consignes reçues et qui les a données.

Mention de sécurité

Douleur dans la poitrine = 15 d'abord, IDE ensuite. Repos strict, demi-assis, aucun médicament sans accord du 15.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road — Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : ARS IDF/SGGIF, fiches urgence EHPAD n° 16 (2016) ; ARS IDF/STARAQS, guide ESMS handicap fiche 9 (2023) ; ASSURE IDF, fiche 14 (2023) ; OMéDIT Centre-Val de Loire, Urgences en EHPAD : dotations (2025) ; protocole DOTR Aide à la prise des traitements si besoin ; arrêté du 26/06/2026 (actes AS/AP/AES, ECG IDE).

Réf. DOTR-AS-THORAX | Version 1.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature