Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Gastrostomie : sonde ou bouton arraché ou bouché

Sonde ou bouton sorti, déplacé, ou qui ne passe plus (adulte, enfant ; MAS, FAM, IME, EHPAD) : protéger l'orifice, garder la sonde, IDE immédiatement.

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · douleur abdominale intense ou ventre dur, saignement abondant de l'orifice, vomissements avec toux ou gêne respiratoire (inhalation).

1 · Je sécurise

- Sonde sortie : **compresse propre** sur l'orifice, maintenue sans appuyer.
- **Garder la sonde** (ou le bouton) pour l'IDE : taille et modèle.
- Nutrition en cours : **arrêter la pompe**, clamper la tubulure.
- Vomissements : installer assis ou sur le côté, ne pas laisser seul.

2 · J'observe et je mesure

- **Heure** de l'arrachement ou de la découverte : **l'orifice peut se refermer en ~2 h**.
- Sonde **arrachée**, **déplacée** (graduation changée, fuite) ou **bouchée** (rien ne passe) ?
- Douleur, ventre dur ou gonflé, saignement, fièvre, vomissements ?
- Gastrostomie récente (< 3 mois) ou sonde jéjunale ? (dossier, PAI) : le dire à l'IDE.

3 · J'agis

- **Appeler l'IDE immédiatement** (sur place ou d'astreinte), de jour comme de nuit.
- IDE non joignable tout de suite : médecin d'astreinte, DOTR ou **15** (« gastrostomie arrachée à ... h »).
- Préparer : sonde de rechange prévue, compresses, seringue, fiche de la sonde ou PAI.
- Sonde **bouchée** : arrêter la nutrition, **ne rien injecter** , prévenir l'IDE.
- Enfant (IME) : appliquer le PAI ; prévenir les parents.

Je ne fais pas

- **Réintroduire** la sonde ou un objet dans l'orifice (geste IDE).
- **Forcer**, injecter de force, déboucher avec un mandrin, un soda ou un jus.
- Donner nutrition, eau ou médicaments par une sonde déplacée ou douteuse.
- Jeter la sonde ; attendre le matin pour prévenir.

J'alerte

Appel 15 immédiat si :

- Ventre dur, douleur intense, saignement abondant.
- Vomissements avec toux ou gêne respiratoire.
- Sonde arrachée, IDE et médecin injoignables : ne pas laisser passer les 2 h.

J'appelle l'IDE (à défaut : médecin d'astreinte ou DOTR) si :

- **Toute sonde ou bouton arraché, sorti ou déplacé** : immédiatement.
- Sonde bouchée, fuite autour de la sonde, nutrition qui ne passe plus.
- Douleur, fièvre ≥ 38 °C, rougeur ou écoulement de l'orifice.

Je surveille et je trace

- Orifice (saignement, écoulement, rougeur), douleur, ventre, température.
- Tracer : heures (arrachement, appel), intervenant, suite donnée ; repas et médicaments non donnés.

Mention de sécurité

Le temps compte : l'orifice peut se refermer en 2 h. On protège, on garde la sonde, on appelle l'IDE tout de suite. On ne réintroduit rien et on ne force jamais.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : ARS IDF/STARAQS, Situations d'urgence en ESMS handicap, fiche 24 Gastrostomie (2023) ; Tous à l'école (INSERM), fiche Gastrostomie ; protocole DOTR IDE « Gastrostomie : sonde arrachée, déplacée ou bouchée » (10/2026) ; arrêté du 26/06/2026, art. 1 III et art. 2.

Réf. DOTR-AS-GASTRO | Version 1.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature