Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Hémorragie externe

Saignement abondant ou qui ne s'arrête pas (plaie, varice, ulcère de jambe) : comprimer, allonger, alerter. Tout public ; vigilance sous anticoagulant.

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · saignement en jet ou qui imbibe vite les linges, pâleur, sueurs, sensation de froid, malaise, somnolence.

1 · Je sécurise

- Je mets des **gants** ; un collègue appelle le 15 si le saignement est abondant.
- J'**appuie fort** sur la plaie (compresses, linge propre), sans relâcher.
- J'**allonge** la personne (lit, sol) et je la couvre.
- Objet planté dans la plaie : **ne pas le retirer**.

2 · J'observe et je mesure

- Abondance : jet, linge imbibé en quelques minutes, flaque.
- Pâleur, sueurs, froid, malaise, somnolence = **aggravation**.
- Pouls, TA, conscience (seuils : « Fiche 0 — Signes de gravité »).
- **Anticoagulant ou antiagrégant ?** (Kardégic, Plavix, Eliquis, Xarelto, AVK…).

3 · Je comprime ; garrot si échec

- Comprimer **jusqu'au relais** ; pansement compressif seulement si le saignement est arrêté.
- Ça traverse le pansement : **reprendre la compression** par-dessus.
- Membre, compression **inefficace ou impossible** : **garrot** 5 à 7 cm au-dessus de la plaie, hors articulation.
- Garrot industriel si disponible, sinon lien large non élastique ; **noter l'heure de pose**.
- Saignement de nez : protocole « Épistaxis ».

Je ne fais pas

- Relâcher la compression pour « voir si ça saigne encore ».
- Poser un garrot élastique de prise de sang, ou un garrot ailleurs que sur un bras ou une jambe.
- Desserrer ou retirer un garrot **sans avis médical**.
- Faire boire ou manger ; nettoyer longuement une plaie qui saigne beaucoup.

J'alerte

Appel 15 immédiat si :

- Saignement **abondant** ou qui ne s'arrête pas malgré la compression.
- Pâleur, sueurs, malaise, somnolence ; **garrot posé**.
- Vomissement de sang, sang rouge abondant dans les selles.

J'appelle l'IDE (à défaut : médecin d'astreinte ou DOTR) si :

- Tout saignement **sous anticoagulant ou antiagrégant**, même arrêté.
- Plaie profonde, béante, du visage ou de la main.
- Saignements inhabituels sous anticoagulant : urines, gencives, bleus.

Je surveille et je trace

- En continu jusqu'aux secours : conscience, pâleur, sueurs, reprise du saignement.
- Tracer : heure, siège, abondance, gestes, **heure du garrot**, qui a été prévenu.
- Saignement arrêté : protocole « Plaie simple » ; l'IDE juge s'il faut une suture.

Mention de sécurité

Comprimer fort, sans relâcher. Sur un membre, si la compression échoue : garrot, heure notée, jamais retiré sans avis médical.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : DGSCGC, recommandations PSC1 : hémorragies externes, compression directe, garrot (12/2023) ; ERC Guidelines 2025 First Aid (Resuscitation 2025;215) ; Resuscitation Council UK, First Aid Guidelines (27/10/2025).

Réf. DOTR-AS-HEMO | Version 2.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature