Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Hyperthermie

T° ≥ 38 °C (âgé : ≥ 37,8 °C ou + 1,1 °C sur l'habituel) : découvrir, faire boire, chercher la gravité, prévenir l'IDE. Adulte et enfant (IME : PAI d'abord).

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · ne répond pas normalement, respire mal, convulsion ; fièvre avec taches violacées qui ne s'effacent pas à la pression (purpura).

1 · Je sécurise

- Confirmer la mesure (fiche « Surveillance de la température »).
- **Découvrir** (drap léger), pièce aérée ; ne pas surcouvrir.
- Somnolent ou avale mal : rien par la bouche ; demi-assis ou **PLS**.

2 · J'observe et je mesure

- Pouls, TA, **FR sur 1 min**, SpO2 ; **marbrures** ; confusion ou somnolence nouvelles ?
- Foyer : toux, brûlures urinaires, diarrhée, plaie ou escarre rouge, sonde ?
- **Neuroleptique commencé ou augmenté récemment ?** Antibiotique depuis < 48 h ?
- Ne parle pas : changement de comportement, geignement. Diabétique : glycémie (AS/AP).

3 · J'agis

- Faire boire **souvent, par petites quantités** (texture adaptée), sauf restriction prescrite.
- Paracétamol « si besoin » : **après validation de l'IDE** (protocole « Paracétamol – Douleur et/ou fièvre »).
- Recontrôler la T° au délai fixé par l'IDE. Toux, diarrhée : fiche « Épidémie d'IRA ou de GEA en ESMS ».

Je ne fais pas

- Donner un antipyrétique de sa propre initiative.
- Bain froid, glace, froid intense sur la peau.
- Faire boire une personne somnolente ou qui fait des fausses routes.
- Mettre une agitation fébrile sur le compte du « comportement ».

J'alerte

Appel 15 immédiat si :

- Fièvre avec **purpura**, trouble de conscience, convulsion ou gêne respiratoire.
- Forte chaleur + T° > 39 °C, propos incohérents ou malaise : **coup de chaleur** → mettre au frais (fiche « Vague de chaleur »).
- Signe de gravité (colonne IDE) et **IDE non joignable tout de suite**.

J'appelle l'IDE (à défaut : médecin d'astreinte ou DOTR) si :

- **Sans délai** : T° > 39 °C, FR > 25/min, PAS < 100 mmHg, pouls > 120/min, SpO2 < 90 %, marbrures, confusion.
- **Sans délai** : fièvre après début ou hausse d'un **neuroleptique** (urgence).
- Dans l'heure : T° ≥ 38 °C (âgé ≥ 37,8 °C ou + 1,1 °C), même bien tolérée.
- Enfant : selon le PAI ; mou, geignard, inconsolable ; **< 3 mois : avis médical urgent**.

Je surveille et je trace

- Tracer : T° (heure, site), paramètres, boissons, urines, signes associés, mesures, IDE prévenue et consignes.
- But : **le confort**, pas un chiffre normal ; signaler toute aggravation.

Mention de sécurité

La fièvre est un signal : on cherche la gravité et la cause, pas seulement le chiffre. Pas d'antipyrétique sans validation de l'IDE.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : ARS IDF/SGGIF (2016) et ARS IDF/STARAQS (2023), fiches Fièvre ; ASSURE IDF (2023) ; High KP et al., IDSA (2009) ; HAS, fièvre de l'enfant (2016) ; info.gouv.fr, vagues de chaleur (08/2026) ; arrêté du 26/06/2026.

Réf. DOTR-AS-HYPERT | Version 2.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature