Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Hypoglycémie

Glycémie < 0,70 g/L ou malaise chez un diabétique : resucrer si la personne avale bien, recontrôler, alerter. Adulte et enfant (IME : PAI d'abord).

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · ne répond pas ou répond mal, convulsion, ne peut pas avaler : rien par la bouche, PLS, 15.

1 · Je sécurise

- Asseoir ou allonger ; rester auprès de la personne.
- **Protocole individuel ou PAI** : l'appliquer.
- Somnolent, confus ou avale mal : **rien par la bouche** ; PLS s'il ne répond pas bien.

2 · J'observe et je mesure

- **Glycémie capillaire (AS/AP)** sans retarder le sucre ; mesure impossible et signes typiques : resucrer.
- Signes : sueurs, pâleur, tremblements, faim, agitation, confusion, changement de comportement.
- Traitement : insuline, **gliclazide (Diamicron), glimépiride (Amarel), répaglinide (Novonorm)** ?
- Repas sauté ou incomplet, vomissements, effort, infection ?

3 · J'agis

- Adulte, avale bien : **15 g de sucre** = 3 morceaux n° 4, ou 15 cL de jus de fruits ou de soda non light.
- Troubles de déglutition : gel ou sirop gélifié **selon prescription**. Enfant : quantité du PAI.
- **Recontrôle à 15 min** : toujours < 0,70 g/L → 2e resucrage et IDE sans délai.
- Corrigée : **collation** (pain, biscuits) si le repas est à plus d'1 h, sinon le repas.

Je ne fais pas

- Mettre du sucre ou faire boire une personne qui ne répond pas bien ou avale mal.
- Injecter du glucagon : **geste de l'IDE**.
- Donner le traitement du diabète de l'heure (comprimés) sans avis de l'IDE.

J'alerte

Appel 15 immédiat si :

- Ne répond pas, convulsion, **ne peut pas avaler**.
- Toujours < 0,70 g/L **après 2 resucrages**.
- Glycémie < 0,70 g/L non corrigée et **IDE non joignable tout de suite**.

J'appelle l'IDE (à défaut : médecin d'astreinte ou DOTR) si :

- **Toute** hypoglycémie, même corrigée : sans délai (traitement à revoir).
- Sous **sulfamide ou glinide** : récidive prolongée → IDE sans délai ; injoignable → 15.
- Personne **non diabétique** (cause à chercher) ; glycémie > 3 g/L, vomissements, refus de manger.

Je surveille et je trace

- Tracer : heure, glycémies, signes, sucre donné (quantité), résultat, IDE prévenue.
- Glycémie de contrôle au délai fixé par l'IDE : **récidive possible pendant plusieurs heures**.
- Hypoglycémies répétées : le signaler au médecin (DOTR) pour adapter le traitement.

Mention de sécurité

Conscient et avale bien : sucre d'abord, glycémie à 15 min. Sinon : rien par la bouche, PLS, 15. Le glucagon est un geste de l'IDE.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : Fédération française des diabétiques, hypoglycémie (2024) ; Diabète Québec, dépliant hypoglycémie (11/2025) ; ARS IDF/STARAQS, fiche Hypoglycémie (2023) ; ASSURE IDF (2023) ; OMéDIT IDF/ARS IDF, PECM ESMS handicap (2025) ; arrêté du 26/06/2026 (art. 2 B).

Réf. DOTR-AS-HYPOG | Version 2.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature