Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Infection urinaire / Cystite suspectée

Brûlures, envies fréquentes, douleur du bas-ventre : repérer fièvre et gravité, recueillir les urines si l'IDE le demande. Adulte et enfant.

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · ne répond pas normalement, respire mal ; fièvre avec taches violacées qui ne s'effacent pas à la pression (purpura).

1 · Je sécurise

- Toilettes au calme ; change rapide, toilette intime.
- Sonde à demeure : tuyau non coudé, poche **plus bas que la vessie**, système **jamais ouvert**.
- Ne parle pas : cris à la miction, mains sur le bas-ventre = douleur possible.

2 · J'observe et je mesure

- **Température** : ≥ 38 °C (âgé : ≥ 37,8 °C ou + 1,1 °C) ou < 36 °C ; frissons ?
- Brûlures, envies fréquentes, fuites nouvelles, douleur du bas-ventre ou **des lombes** ?
- Pouls, TA, FR ; bas-ventre tendu (globe) ? Dernières selles ?
- **Urines troubles ou odorantes, seules** : pas un signe d'infection (souvent : boit peu).

3 · J'agis

- Faire boire régulièrement, sauf restriction prescrite (texture adaptée).
- Recueil **à la demande de l'IDE** (AS/AP, AES) : toilette, 2e jet, flacon stérile étiqueté ; conservation selon consigne.
- Femme < 65 ans sans gravité : l'IDE applique le protocole « Cystite simple non compliquée – Femme < 65 ans ».

Je ne fais pas

- Prélever dans la **poche** ou sur la sonde : geste infirmier.
- Conclure « infection urinaire » sur une confusion, une chute ou une odeur d'urine.
- Donner un antibiotique ou un antalgique de sa propre initiative.
- Limiter les boissons par peur des fuites.

J'alerte

Appel 15 immédiat si :

- Fièvre ou T° < 36 °C avec **marbrures**, confusion brutale, PAS < 100 mmHg ou FR > 25/min, IDE non joignable.
- Fièvre avec **purpura** ou trouble de conscience.

J'appelle l'IDE (à défaut : médecin d'astreinte ou DOTR) si :

- **Sans délai** : fièvre ou frissons ; **douleur du dos (lombes)** ; vomissements.
- **Sans délai** : signes urinaires chez un homme, un porteur de sonde, un enfant, une femme enceinte.
- Dans l'heure : brûlures, envies fréquentes, douleur du bas-ventre ; urines rouges.
- Confusion ou chute **sans** signe urinaire : chercher une autre cause (globe, selles, douleur, médicaments).

Je surveille et je trace

- Tracer : signes, T°, boissons, mictions, recueil (heure), IDE prévenue et consignes.
- **BU positive sans signe = pas de traitement** (colonisation fréquente) : le médecin décide.

Mention de sécurité

Une odeur, des urines troubles ou une BU positive ne suffisent pas : il faut des signes. Fièvre, douleur lombaire, homme ou sonde = IDE sans délai.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : Guide Prélèvements microbiologiques en EHPAD (infectiologie.com, 01/2024) ; CPias Hauts-de-France, IU en EHPAD (04/2026) ; SPILF (2015) ; Nicolle LE et al., IDSA (2019) ; High KP et al., IDSA (2009) ; arrêté du 26/06/2026 (art. 2 B).

Réf. DOTR-AS-IU | Version 2.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature