Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Paracétamol – Douleur et/ou fièvre

Aide à la prise de paracétamol per os prescrit « si besoin », chez un résident adulte pesant 50 kg ou plus, après validation de l'IDE à chaque prise.

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · ne répond pas normalement, respire mal, convulsion, douleur dans la poitrine, taches violacées avec fièvre (purpura).

1 · Je sécurise

- **Avant chaque prise : appeler l'IDE** (à défaut, le médecin d'astreinte) : elle évalue et valide, ou non.
- Personne n'est joignable : **pas de paracétamol**. Mesures sans médicament ; doute → 15.
- Somnolent, avale mal, vomit : **rien par la bouche**, appeler l'IDE.

2 · J'observe et je mesure

- Prescription nominative « si besoin » : indication, dose, délai, maximum / 24 h, durée.
- Schéma DOTR : **1 g par prise**, **6 h minimum** entre deux prises, **3 g / 24 h maximum**.
- **Cumul des 24 h** : dernière prise ; autres médicaments contenant du paracétamol (Ixprim, Lamaline, Izalgi, codéinés…).
- Douleur (EN, Algoplus…) ou température notée **avant** la prise. Allergie connue ?

3 · J'agis

- Après validation : aide à la prise **(AS/AP)** de la forme prescrite (comprimé, sachet, effervescent).
- Éducateur, AES : aide à la prise seulement après **validation explicite** de l'IDE ou du médecin (L.313-26 CASF).
- Fièvre : découvrir, faire boire (protocole « Hyperthermie »). Douleur : protocole « Douleur ».
- Durée : **3 jours si fièvre, 5 jours si douleur**, puis avis médical.

Je ne fais pas

- Donner du paracétamol **de sa propre initiative**, même « pour un simple mal de tête ».
- Écraser, couper ou préparer une dose ; prendre dans le stock d'un autre résident.
- Donner à un enfant ou à un adulte **de moins de 50 kg** : prescription individuelle.
- Donner pour une douleur intense, inhabituelle, thoracique ou abdominale : appeler.

J'alerte

Appel 15 immédiat si :

- Prise de **plusieurs doses par erreur** ou surdosage suspecté : 15 **sans attendre de symptôme**.
- Fièvre avec marbrures, confusion brutale ou respiration rapide (FR > 25/min), IDE non joignable.

J'appelle l'IDE (à défaut : médecin d'astreinte ou DOTR) si :

- Douleur ou fièvre non soulagée après la prise.
- Vomissements, éruption cutanée, jaunisse après la prise.
- Dose maximale atteinte et besoin persistant.

Je surveille et je trace

- Tracer : heure, dose, motif, score ou T° avant, **qui a validé et à quelle heure**, **cumul 24 h**.
- Recontrôler la T° ou recoter la douleur **au délai fixé par l'IDE** ; tracer l'effet.
- Besoin chaque jour : le signaler pour réévaluation médicale (DOTR).

Mention de sécurité

Pas de « si besoin » sur sa seule appréciation : validation de l'IDE ou du médecin à chaque prise (protocole DOTR Aide à la prise des traitements si besoin). Additionner tout le paracétamol des 24 h.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : RCP Doliprane 1000 mg (ANSM, MAJ 25/08/2025) ; L.313-26 CASF ; TA Dijon, 25/01/2024, n° 2000998 ; CAA Lyon (commentée 02/2026) ; arrêté du 26/06/2026 (art. 2 B II) ; OMéDIT IDF/ARS IDF, PECM en ESMS handicap (2025).

Réf. DOTR-AS-PARA | Version 2.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature