Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Plaie simple

Éraflure, coupure ou déchirure superficielle de la peau (dont peau fragile de la personne âgée), adulte et enfant : premiers soins et alerte de l'IDE.

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · saignement abondant ou en jet non arrêté par la compression, malaise, plaie profonde du cou, du thorax ou du ventre.

1 · Je sécurise

- Hygiène des mains, gants.
- Saignement : **comprimer** avec une compresse propre, sans relâcher, jusqu'à l'arrêt.
- Installer la personne assise ou allongée.
- Peau qui se décolle (lambeau) : **ne pas arracher**, laisser en place.

2 · J'observe et je mesure

- Où ? Taille ? Profonde (bords écartés, graisse visible) ? Saigne-t-elle encore ?
- Comment ? Chute, objet, **morsure** (humain, animal) ? Terre, rouille, corps étranger ?
- **Anticoagulant ou antiagrégant ?**
- Douleur, bouge-t-elle normalement les doigts ou le membre ?

3 · J'agis

- **Laver à l'eau et au savon** (ou sérum physiologique), rincer, sécher en tamponnant.
- Couvrir d'un pansement propre ; peau fragile : compresse et bande, pas d'adhésif sur la peau.
- Photo de la plaie au médecin via **HEALPHI** si l'IDE le demande.
- L'IDE vérifie la **vaccination antitétanique** et décide de la suite (colle, soins, avis).

Je ne fais pas

- Mettre un antiseptique systématiquement : l'eau et le savon suffisent pour une plaie simple.
- Couper ou arracher un lambeau de peau, retirer un corps étranger enfoncé.
- Fermer la plaie (strips, colle) : décision et geste de l'IDE.
- Mettre coton, poudre, crème ou pommade non prescrite.

J'alerte

Appel 15 immédiat si :

- Saignement abondant qui ne s'arrête pas malgré une compression continue bien faite.
- Plaie profonde avec membre froid, pâle, ou qui ne bouge plus.
- Signe de gravité (pâleur, sueurs, pouls > 120/min, PAS < 100 mmHg) et IDE non joignable.

J'appelle l'IDE (à défaut : médecin d'astreinte ou DOTR) si :

- **Plaie profonde, morsure, plaie souillée**, corps étranger.
- Plaie du **visage** ou de la **main** ; plaie sous **anticoagulant**.
- Lambeau de peau (dermabrasion, décollement) chez la personne âgée.
- Toute plaie : l'IDE est prévenu le jour même.

Je surveille et je trace

- Tracer : heure, mécanisme, localisation, taille, soins faits, qui a été prévenu.
- Les jours suivants : rougeur qui s'étend, chaleur, pus, fièvre, douleur qui augmente → IDE.
- Chute à l'origine de la plaie → protocole « Chute ».

Mention de sécurité

Eau + savon, compression, pansement propre : c'est tout. Morsure, plaie profonde, souillée, visage, main ou anticoagulant = IDE sans attendre.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : SFMU/SFFPC/SOFCPRE/SPILF/GFRUP, RFE Plaies aiguës en structure d'urgence (2017) ; ARS IDF/SGGIF, fiches urgence EHPAD, Plaie (2016) ; ARS IDF/STARAQS, ESMS handicap, Plaie (2023) ; arrêté du 26/06/2026 (actes IDE art. 1 V, actes AS/AP/AES art. 2).

Réf. DOTR-AS-PLAIE | Version 2.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature