Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Refus de traitement

La personne refuse, recrache ou repousse son traitement, une fois ou de façon répétée (adulte, enfant, personne non communicante) : comprendre, ne pas forcer, tracer.

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · toux, étouffement ou respiration bruyante pendant la prise, trouble de conscience, convulsion.

1 · Je sécurise

- **Ne pas forcer** : arrêter, rester calme, proposer de reprendre plus tard.
- Toux ou étouffement pendant la prise : arrêter (« Fausse route / Obstruction des voies aériennes »).
- Garder la dose refusée à part, identifiée, pour l'IDE.

2 · J'observe et je mesure

- **Pourquoi ?** goût, taille du comprimé, douleur à avaler, nausées, effet indésirable, peur, moment mal choisi.
- **Troubles de déglutition** ? toux, bavage, comprimé gardé en bouche.
- Douleur (dents, bouche), fièvre, comportement changé ? Non communicant : grille habituelle (Algoplus, GED-DI…).
- Médicament **critique** ? antiépileptique, insuline, anticoagulant, antiparkinsonien, corticoïde.

3 · J'agis

- **Respecter le refus** ; expliquer simplement à quoi sert le médicament.
- Réessayer plus tard, avec un autre professionnel, dans le délai indiqué par l'IDE.
- Prévenir l'**IDE** : elle voit avec le médecin (autre forme, autre horaire, réévaluation).
- Enfant (IME) : prévenir les parents selon le PAI.

Je ne fais pas

- **Forcer**, maintenir la personne, ouvrir la bouche de force.
- **Dissimuler** le médicament dans un aliment ou une boisson sans **décision médicale tracée**.
- **Écraser** un comprimé, ouvrir une gélule (gestes IDE, après validation médicale ou pharmaceutique).
- Tracer « pris » une dose refusée ou recrachée.

J'alerte

Appel 15 immédiat si :

- Toux, étouffement, respiration bruyante pendant ou après la prise.
- Convulsion > 5 min, trouble de conscience.
- Signe de gravité et IDE non joignable tout de suite.

J'appelle l'IDE (à défaut : médecin d'astreinte ou DOTR) si :

- Refus d'un **médicament critique** : avis rapide, la nuit aussi.
- Refus répété, refus de tous les traitements, ou refus de manger et de boire.
- Douleur à la déglutition, toux à chaque prise, comportement inhabituel.

Je surveille et je trace

- Tracer : médicament, heure, refus total, partiel ou recraché, raison donnée ou supposée, qui a été prévenu.
- Refus répétés : l'IDE informe le médecin pour réévaluer le traitement.
- Surveiller les effets de la dose non prise (crise, glycémie, douleur, agitation).

Mention de sécurité

Le refus se respecte, se comprend et se trace. On ne force pas ; on ne cache pas un médicament dans l'alimentation sans décision médicale écrite.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : CSP L1111-4 (droit de refuser un traitement) ; CASF L311-3 (consentement) et L313-26 ; HAS, Outils de sécurisation de l'administration des médicaments (2011) ; OMéDIT Centre-Val de Loire, Aide à la prise / administration (07/2023) ; arrêté du 26/06/2026, art. 2.

Réf. DOTR-AS-REFUS | Version 2.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature