Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Règles douloureuses

Douleurs pendant les règles chez une adolescente ou une femme (IME, FAM, MAS), y compris non communicante : confort, antalgique prescrit, signes d'alerte.

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · malaise, saignement très abondant avec pâleur, douleur brutale du ventre ; tampon ou coupe avec forte fièvre et éruption.

1 · Je sécurise

- Installer au calme, en position confortable.
- Respecter l'intimité ; une professionnelle si possible pour les soins.
- Changer la protection et faire la toilette aussi souvent que nécessaire.
- Tampon ou coupe : vérifier qu'il a été changé selon la notice.

2 · J'observe et je mesure

- Pendant les règles ? Douleur habituelle chez elle ?
- Douleur : EN ; sinon **hétéro-évaluation** prévue (FLACC, GED-DI, EDAAP).
- Non communicante : agitation, cris, repli, refus de manger = douleur possible.
- Température ; saignement inhabituel ?
- Retard de règles, rapport possible ? → **grossesse possible**.

3 · J'agis

- **Chaleur** sur le bas-ventre : bouillotte tiède, enveloppée.
- Proposer à boire ; repos ou marche douce ; activité apaisante connue.
- Antalgique **seulement s'il est prescrit** ; « si besoin » → **validation de l'IDE** d'abord.
- Enfant (IME) : prévenir les parents selon le PAI.

Je ne fais pas

- Donner un antalgique non prescrit, ou celui d'une autre personne (ibuprofène, paracétamol…).
- Bouillotte chaude au contact de la peau, surtout si elle ne peut pas dire « trop chaud ».
- Mettre sur le compte des règles une douleur **différente de d'habitude**.
- Parler d'une éventuelle grossesse devant d'autres résidents ou professionnels non concernés.

J'alerte

Appel 15 immédiat si :

- Malaise, perte de connaissance, pâleur et sueurs.
- Saignement très abondant avec pouls > 120/min ou PAS < 100 mmHg.
- Tampon ou coupe : **forte fièvre, éruption, malaise** → retirer la protection, 15 (choc toxique).
- Douleur brutale et intense du ventre, ventre dur.

J'appelle l'IDE (à défaut : médecin d'astreinte ou DOTR) si :

- Douleur **inhabituelle** (plus forte, d'un seul côté, hors règles) ou qui ne cède pas.
- **Fièvre ≥ 38 °C**, vomissements, brûlures urinaires.
- Saignement plus abondant que d'habitude ou règles qui durent.
- **Possibilité de grossesse** ; avant tout antalgique « si besoin ».

Je surveille et je trace

- Tracer : douleur (score), mesures faites, traitement donné et validé par qui, effet, saignement.
- Réévaluer la douleur après l'antalgique ou les mesures, au délai fixé par l'IDE.
- Règles très douloureuses chaque mois : le signaler pour une consultation médicale.

Mention de sécurité

Confort d'abord ; antalgique seulement s'il est prescrit et, s'il est « si besoin », après validation de l'IDE. Une douleur inhabituelle n'est pas « juste les règles ».

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : DOTR, protocole Aide à la prise des traitements « si besoin » (2026) ; L.313-26 CASF ; TA Dijon 25/01/2024 n° 2000998 et CAA Lyon 2026 (cités par FNASFO 2026) ; Inserm, choc toxique menstruel (communiqué 10/03/2020) ; seuils : ARS IDF/STARAQS, ESMS handicap, fiche 0 (2023).

Réf. DOTR-AS-REGLES | Version 2.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature