Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Soins de bouche

Hygiène et confort de la bouche (dents, gencives, langue, prothèses) chez la personne dépendante, adulte ou enfant, avec ou sans troubles de déglutition.

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · étouffement après une fausse route (protocole « Fausse-route / Obstruction des voies aériennes ») ; visage ou cou gonflé avec gêne pour respirer.

1 · Je sécurise

- Installer **assise ou demi-assise, tête légèrement penchée en avant** ; alitée : sur le côté.
- Troubles de déglutition : **très peu d'eau**, compresse ou brosse juste humide, pas de rinçage.
- Personne qui peut mordre : écarter avec un bâtonnet, **jamais les doigts entre les dents**.
- Hygiène des mains, gants ; matériel personnel (brosse, boîte à prothèse).

2 · J'observe et je mesure

- Lèvres, langue, gencives : sèches, dépôts blancs, plaies, saignement ?
- Dent cassée ou qui bouge, gencive ou joue gonflée ?
- Prothèse présente, adaptée, blessante ?
- **Non communicant** : refus de manger, main à la joue, agitation au soin = **douleur dentaire ?**

3 · J'agis

- **Brosser dents et gencives au moins 2 fois par jour**, brosse souple.
- Langue, joues : compresse humide ; lèvres : hydratant non médicamenteux.
- **Prothèses** : retirer, brosser à part, rincer ; la nuit, dans la boîte nominative.
- Bouche sèche, fin de vie : humidifier souvent selon le plan de soins.

Je ne fais pas

- Faire rincer ou gargariser une personne qui ne sait pas cracher.
- Soin de bouche allongée à plat, ou juste avant de l'installer à plat.
- Mettre un produit médicamenteux (bain de bouche, gel) : IDE sur prescription.
- Forcer l'ouverture de la bouche : arrêter, réessayer plus tard, le signaler.

J'alerte

Appel 15 immédiat si :

- Étouffement, toux inefficace, ne peut plus parler ni respirer après une fausse route.
- Gonflement du visage ou du cou qui s'étend, gêne pour avaler ou respirer, fièvre.

J'appelle l'IDE (à défaut : médecin d'astreinte ou DOTR) si :

- **Dépôts blancs** (mycose), plaie, aphtes, saignement des gencives.
- **Douleur dentaire** suspectée, dent cassée.
- Comportement inhabituel au repas ou au soin.
- Prothèse perdue ou qui blesse ; fièvre ≥ 38 °C avec bouche douloureuse.

Je surveille et je trace

- Tracer : soin fait, état de la bouche, prothèse, refus, saignement.
- Toux ou voix mouillée pendant le soin : arrêter, asseoir, le signaler (fausse route).
- Bouche douloureuse ou refus alimentaire nouveau : pensez dents, l'IDE fait le lien avec le médecin.

Mention de sécurité

Une bouche propre prévient douleurs et infections. Chez la personne qui ne parle pas, une douleur dentaire est une cause fréquente d'agitation : regardez dans la bouche.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : Arrêté du 26/06/2026, art. 2 A II (soins de bouche avec produits non médicamenteux : AS, AP, AES) ; HAS, Stratégies de prévention de la carie dentaire (2010) ; ARS IDF/STARAQS, ESMS handicap, fiche Agitation (douleur dentaire ou ORL) (2023).

Réf. DOTR-AS-BOUCHE | Version 2.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature