Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Situation palliative la nuit

Personne en soins palliatifs (EHPAD, MAS, FAM, IME) inconfortable la nuit : confort, fiche anticipée, IDE ou 15.

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · détresse respiratoire brutale, hémorragie abondante, convulsion : 15 en disant « soins palliatifs ».

Protocole individuel / PAI : sortir la fiche de prescriptions anticipées personnalisées / fiche Urgence Pallia (LAT, directives anticipées, niveau de soins) **avant d'appeler**.

1 · Je sécurise

- Rester près de la personne ; lui parler calmement, même si elle ne répond pas.
- Lumière douce, calme ; un proche présent si c'est son souhait.
- Prévenir l'**IDE (sur place ou d'astreinte)** dès qu'un inconfort apparaît.

2 · J'observe et je mesure

- **Douleur** : grimace, gémissements, crispation au toucher (Algoplus ou grille prévue).
- **Respiration** : essoufflée, bruyante = **encombrement** , pauses ?
- **Angoisse, agitation**, tentatives de se lever ?
- Bouche sèche, position, protection souillée, n'a pas uriné ?

3 · J'agis

- Installer confortablement : **demi-assise** si essoufflée, **sur le côté** si encombrée.
- Soins de bouche, change, coussins.
- Appeler l'IDE ou l'astreinte avec la fiche : elle **applique les prescriptions anticipées**.
- Famille : prévenir comme convenu dans le dossier.

Je ne fais pas

- Donner un traitement « si besoin » sans validation de l'IDE ou du médecin.
- Faire une injection ou poser un traitement de la fiche (geste IDE).
- Faire manger ou boire une personne somnolente ou qui s'étouffe.
- Laisser la personne seule si elle est angoissée.

J'alerte

Appel 15 immédiat si :

- **Détresse** et IDE pas sur place.
- Symptôme insupportable, ni IDE ni médecin joignable.
- Dire « soins palliatifs », lire la fiche et le niveau de soins.

J'appelle l'IDE (à défaut : médecin d'astreinte ou DOTR) si :

- **Tout inconfort nouveau** (douleur, souffle, angoisse).
- Symptôme qui revient ou ne cède pas après le traitement donné.
- Pauses respiratoires : l'IDE prévient médecin et famille.
- Décès probable → protocole « Conduite à tenir en cas de décès ».

Je surveille et je trace

- Tracer : heure, symptôme, mesures, appels, traitement donné par l'IDE, effet.
- Réévaluer le confort à chaque passage et après chaque traitement.
- Enfant (IME) : projet convenu avec les parents et l'équipe ressource de soins palliatifs pédiatriques.

Mention de sécurité

La nuit, on ne laisse pas une personne en fin de vie inconfortable : confort, fiche de prescriptions anticipées, IDE. On respecte ses volontés ; au 15, on précise le contexte palliatif.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : SFAP, fiche Urgence Pallia (2017, PDF 2025) ; HAS, Comment réduire les hospitalisations non programmées des résidents d'EHPAD (2015) ; ARS Normandie, Urgences en EHPAD, volet palliatif (2019) ; DOTR, fiche Midazolam en soins palliatifs (2026) et protocole Aide à la prise des traitements « si besoin » (2026).

Réf. DOTR-AS-PALLIA | Version 2.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature