Établissement

Médecin

CONDUITE À TENIR — AS · AES · ÉDUCATEURS

Surveillance de la température

Fiche méthode : quand mesurer, comment obtenir une valeur fiable, quoi en faire, comment tracer. Mesure confiée par l'IDE (AS/AP, AES). Adulte et enfant.

1 · Quand mesurer ?

- Aux horaires du **plan de soins** ou de la prescription.
- **Dès un signe d'appel** : frissons, sueurs, peau chaude ou froide, marbrures, toux, diarrhée, brûlures urinaires.
- Changement de comportement, confusion, somnolence, chute : chez l'âgé, **la fièvre peut manquer**.
- Épidémie dans le service : selon la consigne de l'IDE.

2 · Comment mesurer ?

- **Toujours le même thermomètre et le même site** ; mode d'emploi du fabricant.
- Au repos, à distance d'un repas, d'une boisson chaude ou froide, de la toilette, d'un effort.
- Aisselle : peau sèche, bras serré contre le corps jusqu'au signal.
- Oreille : embout propre ; enfant : thermomètre auriculaire **après 2 ans** (HAS).
- Valeur inattendue : **recontrôler aussitôt**, autre site ou autre thermomètre.

3 · Que faire de la valeur ?

- **≥ 38 °C** (âgé : ≥ 37,8 °C ou + 1,1 °C sur l'habituel) → protocole « Hyperthermie ».
- **< 36 °C** (< 35 °C = hypothermie) → protocole « Hypothermie ».
- Toujours avec le reste : pouls, TA, FR, conscience, comportement (« Fiche 0 »).
- Connaître **la température habituelle** de la personne (dossier).

Je ne fais pas

- Ajouter ou retirer des degrés (« + 0,5 ») : noter la valeur lue **et le site**.
- Mesurer sous une couverture chauffante, juste après la toilette ou une boisson chaude.
- Utiliser le même embout ou thermomètre sans nettoyage entre deux personnes.
- Donner un antipyrétique parce que « le chiffre est haut » : l'IDE décide.

J'alerte

Appel 15 immédiat si :

- Température anormale avec un signe d'**urgence vitale** (fiche 0) : ne répond pas, respire mal, purpura, convulsion.

J'appelle l'IDE (à défaut : médecin d'astreinte ou DOTR) si :

- T° ≥ 38 °C ou < 36 °C **confirmée** : suivre les protocoles « Hyperthermie » / « Hypothermie ».
- Valeurs incohérentes ou thermomètre douteux : le dire à l'IDE plutôt que deviner.

Je trace

- Valeur, **heure, site**, thermomètre, contexte (après repas, toilette…), signes associés.
- Reporter sur la feuille de surveillance (courbe) : c'est l'évolution qui compte.
- Tracer l'IDE prévenue et ses consignes ; thermomètre en panne : le signaler.

La règle d'or

Un chiffre ne vaut que s'il est fiable et interprété avec la personne : même thermomètre, même site, valeur tracée telle quelle.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : HAS, fièvre de l'enfant, fiche mémo (2016) ; High KP et al., IDSA, fièvre du sujet âgé en institution (2009) ; ARS IDF/SGGIF, fiche 0 (2016) ; ASSURE IDF, fiche D (2023) ; arrêté du 26/06/2026 (art. 2 A et B : recueil des paramètres).

Réf. DOTR-AS-TEMP | Version 2.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature