Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Vomissements

Un ou plusieurs vomissements : protéger des fausses routes, repérer la déshydratation et les signes de gravité. Adulte et enfant (IME : PAI d'abord).

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · ne répond pas ou respire mal après avoir vomi ; vomissement de sang ou d'aspect fécal ; vomissements après un choc à la tête.

1 · Je sécurise

- Mettre **assis** ou, si somnolent, en **PLS** ; ne jamais laisser allongé sur le dos.
- Dégager la bouche (prothèse dentaire, restes) ; rester auprès de la personne.
- Nutrition par sonde : **arrêter la pompe**, garder demi-assis, prévenir l'IDE.

2 · J'observe et je mesure

- Après le vomissement : **tousse, s'étouffe, respire bruyamment** ? (fausse route)
- Aspect : alimentaire, bile, **sang** (rouge ou « marc de café »), **aspect fécal** ?
- Ventre dur ou douloureux ? Gaz, selles ? Fièvre, mal de tête, chute récente ?
- Diabétique : **glycémie capillaire (AS/AP)**. Pouls, TA, température.

3 · J'agis

- Rincer la bouche, changer le linge ; gants, tablier, hygiène des mains (gastro possible).
- Puis proposer à boire **par petites gorgées**, fréquemment ; texture adaptée si troubles de déglutition.
- Antiémétique prescrit « si besoin » : seulement **après validation de l'IDE** (aide à la prise AS/AP).

Je ne fais pas

- Laisser seule et couchée sur le dos une personne qui vomit.
- Faire boire ou manger une personne somnolente ou qui s'étouffe.
- Redonner un médicament vomi sans avis de l'IDE.

J'alerte

Appel 15 immédiat si :

- Vomissement **de sang** ou **d'aspect fécal**.
- Vomissements après un **choc à la tête** (protocole « Traumatisme crânien »).
- Fausse route avec gêne respiratoire ; somnolence, confusion brutale.
- Ventre dur et douloureux, arrêt des gaz (occlusion possible).

J'appelle l'IDE (à défaut : médecin d'astreinte ou DOTR) si :

- Vomissements répétés, ne garde rien, signes de déshydratation.
- **Diabétique** : glycémie < 0,70 g/L ou > 3 g/L, ou ne peut pas manger (traitement à adapter).
- Fièvre, douleur du ventre, mal de tête inhabituel, diarrhée associée.
- Enfant (IME) : selon le PAI ; enfant mou, ne boit plus, vomissements répétés.

Je surveille et je trace

- Tracer : heure, nombre, aspect, quantité, boissons gardées, urines.
- Surveiller la respiration dans les heures suivantes (fausse route : toux, fièvre, essoufflement).
- Lister les autres cas du service (fiche « Épidémie d'IRA ou de GEA en ESMS »).

Mention de sécurité

Vomir expose à la fausse route : jamais sur le dos. Sang, aspect fécal ou choc à la tête = 15.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : ARS IDF/SGGIF, 20 fiches urgence EHPAD (2016) ; ARS IDF/STARAQS, fiches urgence ESMS handicap (2023) ; ASSURE IDF (2023) ; SFMU, RPP Traumatisme crânien léger (2022) ; arrêté du 26/06/2026 (actes AS/AP/AES).

Réf. DOTR-AS-VOM | Version 2.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature