Établissement

Médecin responsable

PROTOCOLE DE SOINS INFIRMIERS SUR PRESCRIPTION ANTICIPÉE — ARTICLE R.4311-6 (2°) CSP

Constipation – Laxatif oral

Adulte · enfant : options cochées par le médecin · fécalome : protocole « Fécalome – Toucher rectal, extraction, lavement »

URGENCE VITALE → 15 IMMÉDIAT · ventre dur et douloureux, distendu sans gaz, vomissements (fécaloïdes), rectorragie abondante, malaise ou marbrures.

J'applique si

- Selles absentes ou dures (**Bristol 1–2**) par rapport au transit habituel, **gaz conservés**.
- Abdomen souple, sans douleur aiguë.

Je n'applique pas → avis médical

- Occlusion, abdomen aigu, douleur abdominale inexpliquée, rectorragie ; MICI sévère, mégacôlon.
- Fécalome suspecté (fausse diarrhée, agitation, globe) : protocole « Fécalome – Toucher rectal, extraction, lavement ».
- **Lactulose** : intolérance au galactose ou au fructose, déficit en lactase, malabsorption glucose-galactose.

J'agis

RÔLE PROPRE

1. Dernière selle, gaz, Bristol, transit habituel ; abdomen, douleur, nausées ; T°, FC, PA.
2. Hydratation, **déglutition** (eau gélifiée), médicaments constipants.

SUR CE PROTOCOLE

3. **Laxatif coché par le médecin** (cadre ci-dessous) ; un seul osmotique à la fois.
4. Réduire ou arrêter si diarrhée.

SUR AVIS MÉDICAL

5. Échec, autre laxatif, enfant hors des options cochées.

Consigne orale du 15 ou du médecin → télé-prescription écrite, annexée au dossier.

Laxatif (le médecin coche)

☐ **Macrogol 10 g** (Forlax) : 1–2 sachets le matin dans 50 mL d'eau · adulte, enfant ≥ 8 ans

- Jamais dans l'eau gélifiée (elle la liquéfie)

☐ **Lactulose** (Duphalac) adulte : **15–45 mL/j** (1–3 sachets) en 1–2 prises, puis 10–25 mL/j ; effet en 2–3 j

☐ **Suppositoire de glycérine** adulte : 1, une fois

J'appelle le médecin

- Échec à **48 h** (macrogol) ou **72 h** (lactulose).
- Récidive, recours répété, fièvre, globe urinaire associé.

Je surveille et je trace

- Selles (Bristol), produit, heure, résultat ; transit à 24 h.
- AS/AES : surveillance des selles ; jamais de lavement ni de geste rectal.

À retenir : Douleur abdominale aiguë = occlusion jusqu'à preuve du contraire. Ne pas cumuler deux laxatifs osmotiques.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature et cachet du médecin :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road — Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : Arrêté du 26/06/2026 (actes IDE, art. 1 III) ; RCP Forlax 10 g (ANSM, MAJ 20/02/2026), Duphalac 66,5 % (MAJ 12/02/2025) et sachet (MAJ 03/02/2025), suppositoire glycérine Gifrer (MAJ 12/11/2013) ; ARS IDF/SGGIF, fiches urgence EHPAD (2016).