Établissement

Médecin responsable

PROTOCOLE DE SOINS INFIRMIERS SUR PRESCRIPTION ANTICIPÉE — ARTICLE R.4311-6 (2°) CSP

Diarrhée aiguë simple – Racécadotril

Adulte et enfant ≥ 3 mois · réhydratation d'abord, racécadotril en appoint

URGENCE VITALE → 15 IMMÉDIAT · trouble de conscience, marbrures, collapsus, enfant mou ou somnolent, rectorragie abondante ; PAS < 100 ou pouls > 120 avec déshydratation ; œdème du visage ou de la langue.

J'applique si

- **≥ 3 selles** liquides ou très molles en 24 h, état général conservé.
- Sans sang ni pus, sans fièvre, sans déshydratation sévère.

Je n'applique pas → avis médical

- Sang ou pus dans les selles, fièvre ; vomissements prolongés.
- Diarrhée **post-antibiotique** (C. difficile ?) ; fausse diarrhée de fécalome.
- Grossesse, allaitement ; IEC (angio-œdème) : avis.
- Insuffisance rénale ou hépatique : pas de racécadotril chez l'enfant ; avis chez l'adulte.

J'agis

RÔLE PROPRE

1. Selles (nombre, aspect), T°, douleur ; **poids**, diurèse, muqueuses, PA, FC, conscience.
2. **Réhydratation** : boissons fractionnées ; enfant : **SRO** à volonté, alimentation maintenue.
3. **Précautions contact** dès le 1er cas ; C. difficile suspecté : savon puis friction.
4. ≥ 5 cas en 4 jours : fiche socle « Épidémie d'IRA ou de GEA en ESMS » (signalement).

SUR CE PROTOCOLE

5. **Racécadotril** (carte ci-contre) ; arrêt après **2 selles moulées**, **7 jours** au plus.

SUR AVIS MÉDICAL

6. Hydratation SC ou IV, coproculture, PCR C. difficile, autre traitement.

Consigne orale du 15 ou du médecin → télé-prescription écrite, annexée au dossier.

Racécadotril

Adulte (Tiorfan 100 mg)

J1 : 1 gél. d'emblée, puis aux repas (**3 au total**) ; ensuite **1 × 3/j**

Enfant (3 prises/j)

< 9 kg : **1 × 10 mg**

9–13 kg : **2 × 10 mg**

13–27 kg : **1 × 30 mg**

> 27 kg : **2 × 30 mg**

J'appelle le médecin

- Persistance > 24 h, fièvre, douleur, sang, éruption, perte de poids.
- Sujet âgé fragile, nourrisson, diabétique, traitement par IEC ou diurétique.

Je surveille et je trace

- Selles, T°, poids, apports, diurèse, dose, heure, effet ; réévaluer dans les 24 h ; enfant : pesée chaque jour.
- AS/AES : hygiène des mains, signalement de chaque nouvelle selle ou nouveau cas.

À retenir : Le racécadotril ne remplace jamais la réhydratation ; chez l'enfant, le SRO est le traitement essentiel.

Fait à : .....

Le : ..... / ..... / .....

Signature et cachet du médecin :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road — Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : RCP Tiorfan 100 mg gélule, 10 mg et 30 mg sachet (ANSM, MAJ 15/06/2026) ; SF2H, précautions contact (2009) et fiche C. difficile (2025) ; fiches socle DOTR « Hygiène des mains et précautions standard », « Épidémie d'IRA ou de GEA en ESMS ».

Réf. DOTR-IDE-DIARR | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature