Établissement

Médecin responsable

PROTOCOLE DE SOINS INFIRMIERS SUR PRESCRIPTION ANTICIPÉE — ARTICLE R.4311-6 (2°) CSP

Fin de vie – Prescriptions anticipées (PAP)

Adulte en situation palliative avec PAP nominative signée · enfant : équipe de soins palliatifs pédiatriques

URGENCE VITALE → 15 IMMÉDIAT · asphyxie ou hémorragie massive : dose de détresse de la PAP, rester auprès, 15 (« soins palliatifs », LAT) ; détresse non soulagée, astreinte injoignable.

J'applique si

- Situation palliative avec **PAP nominative signée** (patient, date, signature, dose, voie, délai, nombre max).
- Symptôme prévu : **douleur, dyspnée, angoisse, encombrement**, détresse.

Je n'applique pas → avis médical

- **PAP absente, incomplète ou ambiguë** : ne pas appliquer → astreinte ou 15.
- **Au-delà du nombre de doses fixé** ; aucune dose extrapolée.
- **Sédation profonde et continue** : décision collégiale, sur prescription.

J'agis

RÔLE PROPRE

1. Évaluer : symptôme (EN, Algoplus), FR, vigilance ; **globe**, fécalome, bouche sèche ; doses déjà reçues.
2. Demi-assis si dyspnée, **soins de bouche**, calme, présence ; proches prévenus selon leurs souhaits.

SUR CE PROTOCOLE

3. Donner **la dose de la PAP uniquement** (carte ci-contre) ; réévaluer soulagement et FR.
4. Asphyxie, hémorragie massive : dose de détresse, **rester auprès**, linge foncé.

SUR AVIS MÉDICAL

5. Échec au nombre max de doses, autre dose ou molécule, débit continu : astreinte, **EMSP** ou 15.

Consigne orale du 15 ou du médecin → télé-prescription écrite, annexée au dossier.

Selon la PAP

Douleur, dyspnée → **morphine** (ou opioïde de la PAP)

Angoisse, agitation → **midazolam** (SC, IV ; IM si détresse)

Encombrement → **scopolamine** SC, position latérale

- Repères de doses : HAS 2020, fiche DOTR « Midazolam en soins palliatifs »

J'appelle le médecin

- Toute dose de PAP : médecin informé **le jour même** ; non soulagé dans le délai fixé.
- **FR < 10/min** sous opioïde : protocole « Dépression respiratoire aux opioïdes – Naloxone », selon le projet de soins.
- Chute, fracture (sans lien avec la maladie) : 15 selon le niveau de soins.

Je surveille et je trace

- Avant et après chaque dose : symptôme, FR, vigilance, confort.
- Dose, voie, heure, **rang / maximum**, effet ; registre des stupéfiants ; échanges avec les proches.
- Nuit sans IDE : aucun injectable par l'AS/AES ; appel de l'IDE d'astreinte ou du 15.

À retenir : Le but est le confort, mais chaque dose suit une PAP écrite et signée : pas de PAP claire, pas d'injection, on appelle.

Fait à : .....

Le : ..... / ..... / .....

Signature et cachet du médecin :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : HAS, Antalgie des douleurs rebelles et pratiques sédatives chez l'adulte (01/2020) et fiche outil médecine générale ; loi 2016-87 (Claeys-Leonetti) ; SFAP, fiche Urgence Pallia ; RCP Scopolamine Cooper 0,5 mg/2 mL et Bromhydrate de scopolamine Renaudin (ANSM, MAJ 29/09/2026) ; arrêté du 26/06/2026, art. 4 II et IV ; fiche DOTR « Midazolam en soins palliatifs » (10/2026).

Réf. DOTR-IDE-PAP | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature