Établissement

Médecin responsable

PROTOCOLE DE SOINS INFIRMIERS SUR PRESCRIPTION ANTICIPÉE — ARTICLE R.4311-6 (2°) CSP

Gastrostomie : sonde arrachée, déplacée ou bouchée

Adulte et enfant (MAS, FAM, IME, EHPAD) · l'orifice peut se refermer en ≈ 2 h

URGENCE VITALE → 15 IMMÉDIAT · douleur abdominale intense ou ventre dur ; fièvre après repose ou passage (péritonite) ; saignement abondant ; vomissements avec toux ou détresse respiratoire (inhalation).

J'applique si

- Sonde ou bouton **arraché, sorti ou déplacé** (graduation modifiée, fuite).
- Sonde **bouchée** : nutrition ou médicaments ne passent plus.

Je n'applique pas → avis médical

- **Gastrostomie < 3 mois** (trajet non mature) : rien introduire → urgences.
- **Sonde jéjunale** ou gastro-jéjunale : pas de repose → service poseur.
- **Résistance** : ne jamais forcer (faux trajet, péritonite).
- Mandrin, objet, soda ou jus pour déboucher : jamais.

J'agis

RÔLE PROPRE

1. Arrachée : **agir dans l'heure** ; compresse sur l'orifice ; garder la sonde.
2. **Reposer le rechange référencé** sans forcer ; ballonnet à l'**eau** (volume inscrit).
3. Avant tout usage : **retour gastrique**, graduation habituelle, rinçage sans douleur ni fuite.
4. Bouchée : **eau tiède**, seringue **50 mL**, va-et-vient doux ; clamper 5 min, puis 20 min.

SUR CE PROTOCOLE

5. Sans rechange : **Foley** (carte ci-contre), fixée ; **rien ne passe** sans avis médical.

SUR AVIS MÉDICAL

6. Échec du débouchage : changer la sonde (orifice mature) ou avis ; enzymes sur prescription.

Consigne orale du 15 ou du médecin → télé-prescription écrite, annexée au dossier.

Repères

Rechange : **même Ch**, volume du ballonnet inscrit

Seringue **50 mL** (jamais < 20 mL)

Foley : **Ch égal ou inférieur**, ≈ 10 cm, **24–48 h** au plus

- Enfant : PAI, service poseur, parents prévenus

J'appelle le médecin

- Repose impossible ou orifice traumatisé : **urgences**, idéalement l'hôpital poseur.
- Foley en place : sonde définitive sous 24–48 h ; traitements vitaux à réorganiser.

Je surveille et je trace

- Après repose : douleur, ventre, T°, orifice ; graduation à chaque soin ; rincer avant et après usage.
- Dispositif posé (Ch, lot, ballonnet), contrôle, avis.
- Nuit sans IDE : l'AS/AES protège l'orifice, garde la sonde, appelle **immédiatement**.

À retenir : Le temps compte, mais on ne force jamais, et rien ne passe tant que la position n'est pas vérifiée.

Fait à : .....

Le : ..... / ..... / .....

Signature et cachet du médecin :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road — Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : Arrêté du 26/06/2026 (actes IDE), art. 1 III (changement de dispositif à ballonnet, hors 1er remplacement jéjunal) ; ARS IDF/STARAQS, guide ESMS handicap (2023), fiche 24 ; CIUSSS Capitale-Nationale (Québec), PRO-2024-15 (12 semaines) ; HUG, Désobstruction de sonde digestive (rév. 09/09/2026) ; CHUV, PEG-J (04/2026) ; Cliniques Saint-Luc, Sondes de gastrostomie (2019).

Réf. DOTR-IDE-GASTRO | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature