Établissement

Médecin responsable

PROTOCOLE DE SOINS INFIRMIERS D'URGENCE — ARTICLE R.4311-7 CSP

Hypoglycémie – Resucrage / glucagon

Adulte et enfant diabétiques · le plan diabète ou le PAI prime sur ce protocole

URGENCE VITALE → 15 IMMÉDIAT · ne répond pas ; convulsion ; ne peut pas avaler ; < 0,70 g/L après 2 resucrages ; pas de réveil 10 min après le glucagon ; hypoglycémie sous sulfamide ou glinide.

J'applique si

- Glycémie capillaire **< 0,70 g/L** (3,9 mmol/L) ou seuil du plan individuel.
- Sueurs, pâleur, tremblements, confusion, malaise : traiter même si la mesure est impossible.

Je n'applique pas → avis médical

- **Rien per os** si conscience altérée ou déglutition non sûre.
- Glucagon : seulement chez le diabétique **insulinotraité** ; pas si phéochromocytome.
- Glucagon peu efficace si jeûne, dénutrition, alcool : **15**.

J'agis

RÔLE PROPRE

1. **Glycémie capillaire** sans retarder le resucrage ; vérifier la **déglutition**.

SUR CE PROTOCOLE D'URGENCE

2. Conscient : **resucrage** (carte ci-contre, texture adaptée) ; **recontrôle à 15 min**.
3. Encore < 0,70 g/L : 2e resucrage. Corrigée : collation ou repas.
4. Inconscient ou ne peut pas avaler : rien per os, **PLS**, **15** et **glucagon**.
5. Au réveil (≈ 10 min) : glucides per os dès que la déglutition est sûre.

SUR ORDRE DU 15

6. **Glucose 30 % IV** (si voie veineuse en place), 2e glucagon, maintien sur place.

Consigne orale du 15 ou du médecin → télé-prescription écrite, annexée au dossier.

Doses

Resucrage (conscient)

Adulte : **15 g** (3 sucres n° 4 ou 15 cL de jus)

Enfant : **0,3 g/kg** (max 15 g)

Glucagon (inconscient)

Baqsimi 3 mg nasal, dès 1 an, si prescrit

GlucaGen 1 mg IM/SC ; **0,5 mg** si < 25 kg (ou < 6–8 ans)

J'appelle le médecin

- Toute hypoglycémie : médecin informé **le jour même** (adapter le traitement).
- Récidive ; glycémie > 3 g/L après resucrage ; vomissements.

Je surveille et je trace

- Glycémie à 15 min après chaque action, puis à 30–60 min (récidive sous sulfamide, insuline lente).
- Glucides, glucagon (**lot**), heures. Après glucagon : vomissements possibles → PLS, ne pas laisser seul.
- **Compte rendu écrit, daté, signé**, remis au médecin (R4311-7).

À retenir : Déglutition d'abord : rien per os si elle n'est pas sûre. Le glucagon ne remplace pas l'appel au 15.

Fait à : .....

Le : ..... / ..... / .....

Signature et cachet du médecin :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : Art. R4311-7 CSP ; RCP GlucaGen Kit (ANSM, MAJ 27/11/2023), Glucose 30 % Lavoisier (MAJ 19/05/2026) ; EMA, RCP Baqsimi (09/2025) ; Fédération française des diabétiques (2024) ; ISPAD 2018-2022 (0,3 g/kg) ; outil chariot d'urgence DOTR (09/2026).

Réf. DOTR-IDE-HYPO | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature