**Établissement**

**Médecin responsable**

PROTOCOLE DE SOINS INFIRMIERS SUR PRESCRIPTION ANTICIPÉE — ARTICLE R.4311-6 (2°) CSP

# Plaie simple – Colle cutanée

Adulte et enfant ≥ 3 ans · fermeture par un IDE formé, plaie strictement sélectionnée

**URGENCE VITALE → 15 IMMÉDIAT** · saignement non contrôlé par compression ; plaie pénétrante du cou, du thorax ou de l'abdomen ; malaise ou signes de choc.

## J'applique si

- Plaie **propre, linéaire, superficielle**, **< 6 h**, **≤ 3 cm**, berges rapprochables sans tension.
- Saignement arrêté par compression ; zone sèche, hors muqueuse et pli de flexion mobile.

## Je n'applique pas → avis médical

- **Morsure**, puncture, plaie souillée ou infectée, perte de substance, saignement actif.
- **Main**, près d'un orifice ou d'un axe vasculaire, cuir chevelu, zone humide, articulation.
- **Visage** : photo au médecin via **HEALPHI** ; colle seulement sur sa prescription.
- Déficit en aval, atteinte tendineuse, corps étranger, enfant < 3 ans.

## J'agis

**RÔLE PROPRE**

1. Mécanisme, heure, profondeur ; en aval : **motricité, sensibilité, pouls** ; anticoagulant, diabète.
2. Compression, puis **irrigation abondante** (NaCl 0,9 % ou eau + savon) ; pas d'antiseptique systématique.
3. Plaie hors critères : pansement protecteur, photo au médecin (HEALPHI).
4. **Tétanos** : rappel non à jour → **dTP** par l'IDE (≥ 11 ans) ; sinon prescription.

**SUR CE PROTOCOLE**

5. **Steri-Strip** ou **colle cutanée** (carte ci-contre), par un IDE formé.

**SUR AVIS MÉDICAL**

6. Visage, suture, immunoglobulines antitétaniques, antibiotique.

*Consigne orale du 15 ou du médecin → télé-prescription écrite, annexée au dossier.*

## Fermeture

**Steri-Strip**

- Peau sèche, bandes perpendiculaires, espacées de quelques mm, sans tension

**Colle cutanée**

- Berges rapprochées, **en surface uniquement**, fines couches (notice), maintenir jusqu'à polymérisation
- Jamais dans la plaie ni près de l'œil ; ni adhésif ni pommade dessus

## J'appelle le médecin

- Plaie hors critères : photo au médecin (HEALPHI), **le jour même**.
- Désunion, rougeur, écoulement, fièvre, douleur croissante.

## Je surveille et je trace

- Localisation, dimensions, examen en aval, nettoyage, produit, **lot**.
- Garder sec 24–48 h, ne pas gratter ; la colle tombe seule (pas d'ablation sans prescription).

**À retenir :** Conditions non réunies : nettoyage, pansement protecteur et avis. Jamais de colle sur une plaie souillée ou une morsure.

Fait à : .....  Le : ..... / ..... / .....

Signature et cachet du médecin :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road — Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : Arrêté du 26/06/2026 (actes IDE : art. 1 IV-V, art. 4 II « ablation de dispositif de réparation cutanée ») et arrêté « prescriptions » (dispositifs de rapprochement cutané adhésifs) ; RFE SFMU/SFFPC/SPILF/GFRUP « Plaies aiguës en structure d'urgence » (2017) ; calendrier des vaccinations en vigueur.

Réf. DOTR-IDE-PLAIE | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature