Établissement

Médecin responsable

PROTOCOLE DE SOINS INFIRMIERS SUR PRESCRIPTION ANTICIPÉE — ARTICLE R.4311-6 (2°) CSP

Vomissements – Métopimazine / Vogalène

Adulte et enfant ≥ 15 kg (solution si < 15 kg) · 24 h au maximum

URGENCE VITALE → 15 IMMÉDIAT · trouble de conscience ; inhalation (toux, détresse) ; vomissements de sang ou fécaloïdes ; ventre dur ; après un choc à la tête ; déshydratation sévère ; douleur thoracique ou céphalée brutale.

J'applique si

- Nausées ou vomissements **récents, simples**, état général conservé.
- Hydratation orale possible ou surveillance rapprochée disponible.

Je n'applique pas → avis médical

- Hématémèse, vomissements fécaloïdes ou incoercibles, abdomen aigu, traumatisme crânien.
- **Glaucome à angle fermé** ; risque de rétention urinaire (troubles urétro-prostatiques).
- Phénylcétonurie (lyoc : aspartam) ; grossesse ; insuffisance rénale ou hépatique : avis.

J'agis

RÔLE PROPRE

1. Aspect, nombre ; ventre, selles ; T°, céphalée ; conscience, **déglutition**, hydratation ; glycémie si diabétique.
2. Position latérale ou demi-assise ; aspiration buccale si besoin.
3. Boissons fractionnées (SRO chez l'enfant).

SUR CE PROTOCOLE

4. **Métopimazine** 15 min avant les repas, **4 à 6 h** entre deux prises (carte ci-contre).
5. Sujet âgé : sédation, **hypotension** → lever accompagné.
6. Arrêt dès la disparition des symptômes ; **24 h** au maximum.

SUR AVIS MÉDICAL

7. Au-delà de 24 h, autre antiémétique, hydratation SC ou IV ; diabétique sous insuline : adaptation.

Consigne orale du 15 ou du médecin → télé-prescription écrite, annexée au dossier.

Métopimazine

> 12 ans, adulte

Lyoc **7,5 mg**, 4/j max (**30 mg/j**)

- ou gélule 15 mg, 1 à 2/j, sans cumuler les formes

Enfant ≥ 15 kg et ≤ 12 ans

Lyoc **7,5 mg**, 2/j max (**15 mg/j**)

- < 6 ans : lyoc dissous dans un demi-verre d'eau

Enfant < 15 kg

Sol. 0,1 % **0,33 mg/kg**, 1–3/j, max **1 mg/kg/j**

J'appelle le médecin

- Vomissements répétés, fièvre, douleur abdominale, absence d'effet.
- Diabétique (glycémie < 0,70 ou > 3 g/L), sujet âgé fragile, nourrisson.

Je surveille et je trace

- Nombre, aspect, forme, dose, heure, effet ; conscience, hydratation, diurèse, rétention urinaire.
- AS/AES : position latérale, signalement de chaque épisode.

À retenir : La métopimazine traite un symptôme et peut masquer une urgence : ne pas cumuler les formes, respecter l'intervalle.

Fait à : .....

Le : ..... / ..... / .....

Signature et cachet du médecin :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : RCP Vogalène Lyoc 7,5 mg, Vogalène 15 mg gélule, Vogalène 0,1 % solution buvable (ANSM, MAJ 13/03/2026) ; arrêté du 26/06/2026 (actes IDE).