Fiche d'urgence individuelle (PAI)

FICHE SOCLE DOTR
VERSION 1
Mise à jour : Octobre 2026

MODÈLE à remplir par le médecin : une fiche par personne et par risque (épilepsie, anaphylaxie, hypoglycémie).
IME · IEM · MAS · FAM · EAM — médecin, IDE, équipe éducative, représentant légal

À RETENIR

Signée, datée, valable pour une période définie : à partir de quel signe objectif, qui administre quoi, à quelle dose, quand appeler le 15. La fiche et le traitement suivent la personne (sorties, transports).

Sources : Eduscol, fiche spécifique PAI n° 4 « Crise convulsive » (2023) · circulaire PAI MENE2104832C du 10/02/2021 (modèle de forme) · CASF L313-26

IDENTITÉ

Nom, prénom : .....

Date de naissance : .....

Poids (date de la pesée) : .....

Lieu de vie / groupe : .....

Allergies : .....

Validité : du … au … : .....

NUMÉROS

SAMU 15 (ou 112) — adresse à donner : .....

IDE établissement / d'astreinte : .....

Médecin traitant / d'établissement : .....

Spécialiste référent : .....

Représentant légal / parents : .....

Personne de confiance (majeur) : .....

PATHOLOGIE ET SIGNES

Pathologie, traitement de fond : .....

Manifestations habituelles (décrire) : .....

Signe objectif déclenchant le traitement : .....

Signes de gravité → 15 immédiatement

- ☐ Crise > 5 min, ou crises répétées sans reprise de conscience
- ☐ Gêne respiratoire, voix ou visage qui gonfle, malaise
- ☐ Ne se réveille pas, respire mal ; autre : ……

Sources : HAS, épilepsies (10/2020), R58 · Fiche 0 DOTR

CONDUITE À TENIR

- **1** Rester auprès de la personne, noter **l'heure de début**, protéger.
- **2** Faire appeler l'IDE ; signe de gravité → **15**.
- **3** Critère atteint : **administrer** le traitement prévu ci-dessous.
- **4** PLS si inconscient qui respire ; RCP + DSA s'il ne respire pas.
- **5** Surveiller respiration et conscience ; garder **seringue ou stylo** pour les secours.
- **6** Tracer (heures, dose) ; prévenir IDE, médecin, représentant légal.

Sources : Eduscol fiche n° 4 (2023) · RCP Buccolam (EMA) · RCP Anapen 300 (CIS 62538162)

TRAITEMENT D'URGENCE PRÉDOSÉ

Midazolam buccal (Buccolam)

- Dose (RCP) : 3 mois-< 1 an 2,5 mg (3-6 mois : en milieu hospitalier) ; 1-< 5 ans 5 mg ; 5-< 10 ans 7,5 mg ; ≥ 10 ans et adulte 10 mg.
- **Une seule dose** ; pas d'arrêt à 10 min → 15 ; pas de 2e dose sans avis médical.

Dose prescrite / si crise > … min : .....

Adrénaline auto-injectable (Anapen, EpiPen)

- 150 µg : 15-30 kg ; 300 µg : > 30 kg (RCP). Cuisse, face antéro-latérale ; **15 aussitôt** ; 2e stylo à 5-15 min si prescrit.

Dosage, signes déclenchants : .....

Glucagon (IDE)

- GlucaGen 1 mg SC ou IM ; 0,5 mg si < 25 kg ou < 6-8 ans. Baqsimi 3 mg nasal dès 1 an.

Rangement + double pour sorties : .....

Péremption (contrôle par) : .....

Sources : EMA, RCP Buccolam (II/0061, 2024) · RCP Anapen 300 (MAJ 18/09/2026), EpiPen 0,30 (MAJ 14/11/2025) · RCP GlucaGen Kit (CIS 69301034) · EMA, RCP Baqsimi

QUI ADMINISTRE · SIGNATURES

- **IDE** : sur ce protocole signé (R4311-6 2°) ou protocole d'urgence (R4311-7).
- **Non-soignant formé** (éducateur, AES, AS) : **midazolam buccal ou adrénaline auto-injectable seulement**, au critère objectif écrit ici — aide aux actes de la vie courante (L313-26) selon la doctrine ARS/OMéDIT IDF ; position régionale.
- **Glucagon** : IDE (non couvert par cette doctrine).

Personnes formées

Nom, fonction, date : .....

Formateur, date du rappel : .....

Signatures

Médecin (cachet, date) : .....

Représentant légal / personne : .....

Direction : .....

- Copies : dossier, classeur du groupe, trousse de sortie, famille ; **pli fermé** pour les secours. Mise à jour à chaque changement, au moins chaque année.

Sources : CSP R4311-6, R4311-7 · CASF L313-26 · OMéDIT IDF/ARS IDF, PECM en ESMS handicap (01/2025) · Eduscol fiche n° 4 (2023) · circulaire PAI du 10/02/2021

Fiche DOTR, à adapter avec le médecin coordonnateur ou le médecin de l'établissement. Les mentions « proposition DOTR » ne viennent pas d'un texte. Ne remplace ni les procédures de l'établissement ni l'avis médical.