

Etablissement

Médecin responsable

PROTOCOLE MÉDICAL DE SOINS INFIRMIERS — ARTICLE R.4311-6 CSP

Constipation simple

Traitement court après exclusion d'une occlusion, d'un fécalome compliqué ou d'une cause abdominale aiguë.

Indications

- Absence de selles ou selles dures avec gêne modérée.
- Émission de gaz conservée, sans vomissement ni douleur aiguë.
- Constipation habituelle connue et examen clinique rassurant.
- Prescription anticipée laxative disponible.

Vérifications préalables

- Date des dernières selles et des gaz ; aspect selon échelle de Bristol.
- Douleur, défense, distension, vomissements, rectorragies, fièvre.
- Hydratation, mobilité, régime, médicaments constipants et transit habituel.
- Rechercher fécalome ou fausse diarrhée ; vérifier déglutition.

Recommandations / IMPORTANT

- Aucun laxatif si occlusion/douleur aiguë, vomissements fécaloïdes, rectorragie ou altération générale.
- Ne pas cumuler deux laxatifs osmotiques sans prescription.
- Lactulose : exclure galactosémie ; prudence si intolérance au lactose/galactose.
- Aucun geste rectal hors compétence, formation et procédure.

Intervention IDE

- Mesures associées : boissons si autorisées, mobilisation, toilettes après repas.
- Macrogol 10 g : adulte/enfant ≥ 8 ans, 1 à 2 sachets en une prise/j.
- Alternative adulte : lactulose 66,5 % : 10 000–30 000 mg/j, puis 6 650–16 625 mg/j selon l'effet.
- Constipation basse : 1 suppositoire de glycérine adulte, une fois, si prescrit et sans obstacle.

Surveillance et traçabilité

- Tracer symptômes, dernière selle, traitement, dose, heure et efficacité.
- Surveiller gaz, abdomen, douleurs, vomissements et hydratation.
- Réévaluer à 24–48 h ; arrêter/réduire si diarrhée ou douleurs.
- Prévenir le médecin si recours répété ou adaptation de fond nécessaire.

Alerte immédiate

- Avis médical si échec à 48–72 h, fécalome, récurrence ou patient fragile.
- Appel 15 si douleur abdominale aiguë, défense, vomissements fécaloïdes, malaise ou choc.
- Suspendre le traitement si aggravation.

Mention de sécurité

Le médecin signataire coche dans l'établissement l'option utilisable (macrogol / lactulose / glycérine). Les doses ci-dessus ne doivent pas être additionnées par défaut et sont réservées à une constipation simple. Administration ou acte tracé dans le dossier de soins.

Fait à :

Le : / /

Signature et cachet du médecin :