

Etablissement

Médecin responsable

PROTOCOLE MÉDICAL DE SOINS INFIRMIERS — ARTICLE R.4311-6 CSP

Cystite simple non compliquée – Femme < 65 ans

Antibiothérapie selon algorithme signé, uniquement si symptômes typiques, BU positive et absence de complication.

Indications

- Femme de 18 à 64 ans, non enceinte.
- Brûlures mictionnelles, pollakiurie et/ou urgenturies.
- BU positive aux leucocytes et/ou nitrites.
- Absence de fièvre, frissons, douleur lombaire, vomissements ou altération générale.

Vérifications préalables

- Exclure homme, grossesse, sonde, anomalie urologique, immunodépression grave ou DFG < 30.
- Rechercher infection récidivante, antibiotique récent et germe résistant connu.
- Vérifier allergies, interactions et traitement anticoagulant.
- Mesurer température ; relever symptômes et résultat de BU.

Recommandations / IMPORTANT

- BU positive sans symptômes : aucun antibiotique.
- Pas d'ECBU systématique si tous les critères de cystite simple sont réunis.
- Toute fièvre, douleur lombaire, confusion ou fragilité impose un avis médical.
- Ne pas appliquer en EHPAD à une personne âgée ou à un tableau atypique.

Intervention IDE

- 1re intention : fosfomycine-trométamol 3 g per os, dose unique, à distance des repas.
- 2e intention si prévue : pivmécillinam 400 mg per os matin et soir, 3 jours.
- Ne pas associer ; suivre l'algorithme signé et les allergies.
- Hydratation si autorisée ; paracétamol selon protocole distinct.

Surveillance et traçabilité

- Tracer symptômes, BU, molécule, dose, lot si requis, heure et tolérance.
- Réévaluer à 48–72 h : dysurie, pollakiurie, température et douleur lombaire.
- Surveiller rash, diarrhée, vomissements et aggravation.
- ECBU et avis médical en cas d'échec ou récurrence.

Alerte immédiate

- Avis médical si absence d'amélioration à 48–72 h, allergie, intolérance ou doute diagnostique.
- Appel 15 si sepsis, hypotension, confusion aiguë, douleur lombaire majeure ou choc.
- Suspendre et appeler si réaction allergique.

Mention de sécurité

Ce protocole est volontairement limité à la cystite aiguë simple de la femme de moins de 65 ans. Toute situation hors critères relève d'une évaluation et d'une prescription médicales individualisées. Administration ou acte tracé dans le dossier de soins.

Fait à :

Le : / /

Signature et cachet du médecin :