

Etablissement

Médecin responsable

PROTOCOLE MÉDICAL DE SOINS INFIRMIERS — ARTICLE R.4311-6 CSP

Vomissements – Métopimazine / Vogalène

Traitement symptomatique pendant 24 h après exclusion d'une urgence digestive, neurologique ou infectieuse.

Indications

- Nausées ou vomissements récents, simples, avec état général conservé.
- Hydratation orale possible ou surveillance rapprochée disponible.
- Absence de traumatisme crânien, abdomen aigu ou hémorragie.
- Métopimazine prévue par le protocole signé.

Vérifications préalables

- Aspect/nombre des vomissements ; douleur, distension, gaz, selles, fièvre et céphalée.
- Conscience, déglutition, hydratation, poids et diurèse.
- Glaucome, rétention urinaire/prostate, grossesse/allaitement et allergie.
- Dernière dose, autres antiémétiques, sédatifs et alcool.

Recommandations / IMPORTANT

- Aucun traitement si hématomène, vomissement fécaloïde/incoercible, abdomen aigu, TC ou trouble de conscience.
- Contre-indiqué en cas de glaucome ou risque de rétention urinaire d'origine urétroprostatique.
- Prudence chez sujet âgé ; risque de somnolence majoré par alcool et sédatifs.
- Durée maximale du protocole : 24 h.

Intervention IDE

- Adulte/ado > 12 ans : lyc 7,5 mg, 1 par prise, 2 à 4 prises/j ; maximum 30 mg/j.
- Alternative sans cumul : gélule 15 mg, 1 gélule 1 à 2 fois/j.
- Enfant ≥ 15 kg et < 12 ans : lyc 7,5 mg, 1 prise 1 à 2 fois/j ; max 15 mg/j.
- Enfant < 15 kg : solution 0,1 %, 0,33 mg/kg/prise, 1 à 3 fois/j ; max 1 mg/kg/j.

Surveillance et traçabilité

- Tracer nombre/aspect, voie, forme, dose, heure, effet et tolérance.
- Surveiller douleur abdominale, conscience, hydratation, diurèse et inhalation.
- Fractionner les boissons si possible ; réévaluer chaque épisode.
- Avis médical si besoin au-delà de 24 h.

Alerte immédiate

- Avis médical : vomissements répétés, fièvre, douleur, grossesse, déshydratation ou absence d'effet.
- Appel 15 : conscience altérée, inhalation, abdomen aigu, hématomène, choc ou vomissements après TC.
- Suspendre si rétention urinaire ou réaction inhabituelle.

Mention de sécurité

La métopimazine traite un symptôme et peut masquer une pathologie urgente. Ne pas associer les deux formes proposées ; respecter la dose cumulée et réévaluer la cause avant toute nouvelle prise. Administration ou acte tracé dans le dossier de soins.

Fait à :

Le : / /

Signature et cachet du médecin :