Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Suspicion d’AVC

Adulte et enfant · chaque minute compte

15 IMMÉDIAT · visage de travers, bras ou jambe qui ne bouge plus, parole troublée, **même si les signes ont disparu** ; perte brutale de la vue d’un œil, grand déséquilibre, mal de tête brutal et intense ; ne répond pas, convulse.

J’applique si

- Signe neurologique **brutal**, même passager (VITE : carte).
- Non communicant : changement brutal par rapport à l’habituel (équipe, famille, photo, vidéo).

Je ne fais pas

- Donner à manger, à boire ou un médicament, **même le traitement habituel**.
- Attendre que « ça passe » : signes disparus = **15 quand même**.
- Resucrer sans accord du 15 : glycémie < 0,70 g/L → le dire au 15.
- Retarder le 15 pour joindre d’abord l’IDE, le médecin ou la famille.

J’agis

TOUT DE SUITE

1. **15 tout de suite** (ou faire appeler), puis l’IDE.
2. Noter l’**heure vue normale pour la dernière fois**.
3. Allonger ou asseoir, ne pas faire marcher ; répond mal ou vomit : **PLS**, retirer le dentier.
4. TA **aux deux bras**, pouls, SpO2, T° ; **glycémie capillaire** (AS/AP) ; **anticoagulant** (heure de prise) ?
5. Au 15 : heure vue normale, signes, glycémie, TA, traitements ; **ne pas raccrocher sans accord**.

ENSUITE

6. Rester auprès, lui parler. Préparer DLU, ordonnances, directives anticipées ; enfant : PAI, parents.
7. Nuit : porte ouverte, accès éclairé, quelqu’un accueille les secours.

VITE

Visage paralysé (sourire)

Impossible de bouger un membre

Trouble de la parole

En urgence : **15**

Le 15 veut savoir

- heure vue normale
- glycémie, TA aux 2 bras, anticoagulant

J’appelle l’IDE sans délai

- Toujours, **juste après le 15** (sans le retarder).
- Non communicant : changement brutal inexpliqué → IDE sans délai.
- **IDE injoignable** : médecin d’astreinte ; signe de gravité : **15**.

Je surveille et je trace

- En continu : conscience, respiration, parole, force des bras ; aggravation : **rappeler le 15**.
- Ne respire plus : « Arrêt cardio-respiratoire ».
- Heure vue normale, heure des signes, constantes, glycémie, appels, consignes reçues.

À retenir : Signe d’AVC, même passager = 15 immédiatement. Noter l’heure vue normale pour la dernière fois ; rien par la bouche.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road — Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : ARS IDF/STARAQS, guide ESMS handicap, fiches 0 et 12 « Suspicion AVC » (2023) ; ARS IDF/SGGIF, fiches urgence EHPAD n° 12 (2016) ; ASSURE IDF, fiche A (2023) ; HAS, AVC : prise en charge précoce (mai 2009) ; arrêté du 26/06/2026 (actes AS/AP/AES).

Réf. DOTR-AS-AVC | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature