Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Réaction allergique : de l'urticaire à l'anaphylaxie

Tout public · enfant : PAI · aliment, médicament, piqûre d'insecte, latex

15 IMMÉDIAT · lèvres, langue ou gorge qui gonflent, voix changée, gêne pour respirer ou avaler, malaise, perte de connaissance ; éruption avec vomissements ; réaction qui s'étend vite ; **auto-injecteur utilisé : toujours**.

PAI / protocole individuel : auto-injecteur d'adrénaline nominatif (Anapen, EpiPen, Jext) prévu et critères présents : **injecter immédiatement**, face externe de la cuisse, **même à travers les vêtements**, noter l'heure, puis 15. 2e stylo après 5 à 15 min **seulement** si le PAI le prévoit ou sur consigne du 15.

J'applique si

- Réaction **brutale** après un aliment, un médicament, une piqûre d'insecte ou le latex.

Je ne fais pas

- Remettre debout ou faire marcher après un malaise.
- Antihistaminique ou corticoïde « à la place » de l'adrénaline : **ils ne la remplacent pas**.
- Donner un « si besoin » sans validation de l'IDE.

J'agis

TOUT DE SUITE

1. Rester auprès ; **arrêter le contact** avec la cause (repas, médicament, latex, insecte).
2. Malaise : **allonger, jambes surélevées** ; gêne respiratoire : **assis** ; ne répond pas mais respire : **PLS**.
3. Évaluer le **niveau** (carte) ; TA, pouls, SpO2, FR ; heure de début ; cause probable.
4. Niveaux 3-4 : **15 immédiatement**, puis IDE ; auto-injecteur si prévu (bandeau violet).
5. Niveau 5 : massage + DSA (« Arrêt cardio-respiratoire »).

ENSUITE

6. Niveau 1 : IDE et surveillance rapprochée (peut s'étendre). Niveau 2 : IDE sans délai.

Niveaux

1 · local
- boutons, rougeurs ou gonflement localisés, qui grattent

2 · étendu
- éruption étendue, gonflement du cou, sans gêne respiratoire

3 · anaphylaxie
- gorge, langue, voix, respiration, malaise, vomissements

4 · 5
- perte de connaissance · arrêt cardiaque

J'appelle l'IDE sans délai

- Niveau 1 ; niveau 2 **sans délai**.
- Après tout appel au 15.
- **IDE injoignable** : médecin d'astreinte ; signe de gravité : **15**.

Je surveille et je trace

- En continu : respiration, voix, gonflement, conscience, couleur de la peau.
- Après adrénaline : surveillance à l'hôpital décidée par le 15 (rechute possible).
- Heure, cause, niveau, gestes, heure d'injection ; allergie au dossier et au DLU.

À retenir : Gêne pour respirer ou avaler, malaise, gonflement de la gorge = anaphylaxie : adrénaline du PAI sans attendre, puis 15.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : ARS IDF/STARAQS, guide ESMS handicap, fiche 19 « Allergie » (graduation en 5 niveaux, 2023) ; SFMU/SFA/GFRUP/SP2A, RFE Anaphylaxie, Ann Fr Med Urgence 2016;6:342-64 ; OMéDIT IDF/ARS IDF, Que dit la loi sur la PECM en ESMS handicap (janv. 2025) ; RCP Anapen 300 (MAJ 18/09/2026), EpiPen 0,30 (MAJ 14/11/2025).

Réf. DOTR-AS-ALLERG | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature