Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Arrêt cardio-respiratoire

Adulte et enfant (IME) · tout témoin, formé ou non

ARRÊT CARDIAQUE · ne répond pas + ne respire pas ou respire anormalement (gasps lents, bruyants) : **15, massage et DSA tout de suite**.

Je reconnais l'arrêt (10 s au plus)

- Ne répond pas à la voix ni quand je secoue doucement ses épaules.
- Tête basculée, menton relevé : pas de respiration ou respiration **anormale** (gasps).
- Brèves secousses au début : possibles. Respire normalement : **PLS** (« Perte de connaissance »).

Je ne fais pas

- Chercher le pouls, prendre la TA ou la glycémie avant de commencer.
- Arrêter le massage, sauf quand le DSA le demande ou pour le relais.
- Toucher la personne pendant l'analyse et le choc.
- Donner à boire ou un médicament ; déplacer, sauf danger.

Je masse et je défibrille

TOUT DE SUITE

1. Je crie à l'aide : un collègue **appelle le 15** (ou 112) et **apporte le DSA** ; seul : 15 en **haut-parleur** et je masse.
2. Sur le dos, plan dur ; au lit : masser plus fort plutôt que perdre du temps.
3. Centre de la poitrine, bras tendus : **5 à 6 cm**, **100 à 120/min** ; formé : **30/2**, sinon massage seul.
4. **DSA** dès son arrivée (tout témoin) : l'allumer, suivre la voix, reprendre le massage dès qu'il le dit.
5. Changer de masseur à chaque analyse (≈ 2 min) ; continuer jusqu'au relais des secours.

ENSUITE

6. Un collègue cherche la **LAT**, prépare DLU et traitements (fiche « SAED »).

Repères

Adulte

30/2 ou massage seul

5–6 cm · 100–120/min

Enfant (IME)

5 insufflations, puis **15/2**

- enfoncer d'**un tiers** du thorax
- électrodes enfant si disponibles

Ensuite, sans arrêter le massage

- L'IDE (ou d'astreinte) et le cadre d'astreinte.
- Le médecin (coordonnateur, traitant, DOTR) et la famille selon la procédure.

Je surveille et je trace

- Heure de découverte, début du massage, pose du DSA, chocs, arrivée des secours.
- Respiration normale qui revient : PLS, surveillance continue jusqu'aux secours.
- Après : temps d'échange ; soutien des témoins et des résidents.

À retenir : Ne répond pas + ne respire pas normalement = 15, massage, DSA. Seule une décision médicale écrite de non-réanimation, retrouvée, permet de ne pas commencer (la dire au 15). Dans le doute, je masse.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : ERC Guidelines 2025 : Adult Basic Life Support, Paediatric Life Support, Ethics in Resuscitation (Resuscitation 2025;215) ; DGSCGC, recommandations PSC1 (12/2023) ; CSP art. R.6311-15 (DSA par toute personne), L.1111-11 et R.4127-37-2 ; arrêté du 26/06/2026 (actes AS/AP).

Réf. DOTR-AS-ACR | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature