Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Chute

Adulte, personne âgée, personne en fauteuil, enfant (IME)

15 IMMÉDIAT · ne répond pas, respire mal ; saignement abondant ; cou douloureux + fourmillements ; malaise ou douleur thoracique avant la chute ; tête cognée sous **anticoagulant** ou **2 antiagrégants**, ou suivie de somnolence, confusion, plus d'un vomissement, convulsion ; hanche douloureuse, jambe raccourcie ou tournée ; enfant mou ou somnolent.

J'applique si

- Personne **au sol** ou chute observée (lit, fauteuil, glissade), avec ou sans témoin.

Je ne fais pas

- **Relever** si douleur (hanche, cou, dos) ou membre qui ne bouge pas.
- Donner un antalgique « si besoin » sans **validation de l'IDE**.
- Laisser **seule** une personne cognée à la tête sous anticoagulant ou antiagrégant.

J'agis

TOUT DE SUITE

1. **Ne pas relever tout de suite** : parler, observer, couvrir si le sol est froid.
2. Cou ou dos douloureux : **ne pas bouger la tête**, ne pas asseoir.
3. Choc à la tête, plaie, membre déformé ? Paralysie : fracture possible **sans douleur**.
4. Pouls, TA, SpO2 ; **glycémie** si diabète (AS/AP) ; **temps passé au sol** ?

APRÈS ACCORD DE L'IDE OU DU MÉDECIN

5. **Relever** à deux ou au lève-personne ; installer, sonnette à portée.

ENSUITE

6. Plaie → « Plaie simple » ; tête → « Traumatisme crânien » ; bosse : froid 10 min (linge).
7. Enfant : parents selon le PAI. **Déclarer la chute.**

Repères

IDE sans délai si

Pouls **< 50** ou **> 120**

PAS **< 100** mmHg

SpO2 **< 90 %**

Glycémie **< 0,70 g/L**

Au sol **> 1 h**

Sous anticoagulant ?

- Eliquis, Xarelto, Préviscan, Coumadine, Pradaxa

Sous antiagrégant ?

- Kardégic, Plavix, Brilique, Efient

J'appelle l'IDE sans délai

- **Toute chute**, même sans gravité apparente.
- Tête cognée, **65 ans ou plus sous antiagrégant** : avis médical sans délai (scanner < 8 h).
- Douleur, boiterie, plaie, gros hématome ; sans témoin ; 2e chute rapprochée.
- **IDE injoignable** : médecin d'astreinte ; signe de gravité : **15**.

Je surveille et je trace

- Heure, circonstances, témoin, temps au sol, paramètres, qui a été prévenu.
- Dans les 48 h : douleur, boiterie, hématome, comportement inhabituel → IDE.

À retenir : Évaluer avant de relever, relever après accord. Tête cognée sous anticoagulant ou 2 antiagrégants : 15.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road — Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : HAS, Évaluation et prise en charge des personnes âgées faisant des chutes répétées (2009) ; SFMU, RPP Traumatisme crânien léger (2022) ; ARS IDF/STARAQS, Situations d'urgence en ESMS handicap, fiche Chute (2023) ; ARS IDF/SGGIF, fiche 0 (2016) ; arrêté du 26/06/2026 (actes AS/AP/AES, art. 2).

Réf. DOTR-AS-CHUTE | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature