Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Fiche 0 — Signes de gravité : quand appeler le 15, quand appeler l'IDE

Fiche de référence : 3 niveaux, mêmes seuils dans toutes les fiches · adulte ; repères enfant

NIVEAU 1 · URGENCE VITALE → 15 · ne répond pas, ne respire pas ou respire anormalement (RCP + DSA) ; détresse respiratoire (lutte, bruits, lèvres bleues, ne peut plus parler) ; hémorragie abondante ; convulsion > 5 min ou répétée ; trouble de conscience brutal ; douleur thoracique ; signes d'AVC même régressifs ; purpura + fièvre. **Un seul signe suffit.**

Niveau 2 · Chiffres d'alerte

- Pouls **< 50 ou > 120/min** ; PAS **< 100 ou > 200 mmHg** (aux **deux bras**) ; FR **< 10 ou > 25/min**.
- SpO2 **< 90 %** (insuffisant respiratoire : cible du médecin) ; T° **> 39 ou < 36 °C** ; sueurs, marbrures.
- Glycémie (AS/AP) **< 0,70 g/L** non corrigée ou **> 3 g/L** ; **EN > 5 ou Algoplus > 3** ; somnolence, confusion brutale.

Je ne fais pas

- Chercher l'IDE ou lire les protocoles avant d'appeler le 15 (niveau 1).
- Attendre tous les paramètres si c'est manifestement grave.
- Faire boire, manger ou prendre un médicament à une personne somnolente ou confuse.
- Attribuer au « comportement » un changement brutal chez un non-communicant.

J'agis en attendant les secours

TOUT DE SUITE

1. Niveau 1 : j'appelle **moi-même le 15**, sans passer par l'IDE ni le cadre.
2. Je reste auprès ; un collègue apporte le **DSA** et le **DLU** ; la nuit, porte ouverte.
3. Inconsciente qui respire : **PLS**. Ne respire pas normalement : **RCP + DSA**.
4. **PAI** ou protocole individuel (épilepsie, allergie, asthme) : je l'applique.

ENSUITE

5. Message : « Appeler le 15 : le bon message (SAED) » ; puis IDE et cadre d'astreinte.
6. DOTR **n'est pas un service d'urgence**.

Qui j'appelle, jour et nuit

- Niveau 2 : jour, IDE de l'établissement ; nuit, IDE de nuit ou d'astreinte. **Pas de réponse immédiate → 15.**
- Handicap : **changement brutal de comportement + un signe de gravité** = niveau 2.
- Enfant (IME) : PAI d'abord ; geignement, tirage, enfant mou ou inconsolable ; **< 3 mois + fièvre : avis urgent**.

Niveau 3 · À signaler dans l'heure

- T° **≥ 38 °C** (personne âgée : **≥ 37,8 °C** ou + 1,1 °C sur son habituel) ; douleur nouvelle.
- Changement de comportement **sans** signe de gravité ; glycémie **2 à 3 g/L** chez un diabétique.
- Je recontrôle et je trace : heure, chiffres, qui j'ai appelé, consignes reçues.

À retenir : Dans le doute entre deux niveaux, je choisis le plus grave. Urgence vitale : le 15 d'abord, les protocoles ensuite.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : ARS IDF/SGGIF, IDE et AS en EHPAD : CAT en situation d'urgence, fiche 0 (2016) ; ARS IDF/STARAQS, situations d'urgence en ESMS handicap, fiche 0 (2023) ; ASSURE IDF, fiches A et D (2023) ; High KP et al., IDSA, fièvre du sujet âgé en institution (2009) ; arrêté du 26/06/2026 (actes AS/AP/AES).

Réf. DOTR-AS-FICHE0 | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature