Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Diarrhée

Adulte et enfant · IME : PAI d'abord

15 IMMÉDIAT · ne répond pas normalement, somnolence inhabituelle, confusion brutale, marbrures, malaise ; sang abondant dans les selles ; PAS < 100 mmHg ou pouls > 120/min si l'IDE n'est pas joignable.

J'applique si

- Au moins **3 selles liquides en 24 h**.

Je ne fais pas

- Antidiarrhéique de sa propre initiative.
- Supprimer les boissons par peur des selles.
- Partager toilettes, chaise percée ou matériel sans nettoyage-désinfection.
- Faire boire une personne somnolente ou qui fait des fausses routes.

J'agis

TOUT DE SUITE

1. **Précautions contact** : gants et tablier pour le change ; matériel dédié si possible.
2. **Hygiène des mains** : savon si souillées, puis friction hydro-alcoolique.
3. Selles (nombre, **sang, glaires**), vomissements, douleur ; T°, pouls, TA ; urines rares ou foncées ?
4. **Déshydratation** : bouche sèche, somnolence, confusion, malaise au lever ? Antibiotique ou laxatif récent ?
5. Faire boire **souvent, par petites quantités** (eau gélifiée si besoin) ; SRO **s'il est prescrit**.
6. Change rapide, soins de peau (irritations, escarres) ; alimentation légère selon l'appétit.

APRÈS ACCORD DE L'IDE OU DU MÉDECIN

7. Antidiarrhéique « si besoin » : **après validation de l'IDE** (aide à la prise AS/AP).

ENSUITE

8. Autres cas dans le service : **IDE et cadre le jour même**.

J'appelle l'IDE sans délai

- **Sang dans les selles ou fièvre** ; douleur du ventre ; vomissements ; diarrhée après antibiotique.
- Déshydratation, ne boit pas, urines rares ; pas d'amélioration en 24 h ; **fécalome** suspecté (diarrhée en filet).
- Enfant : selon le PAI ; enfant mou, refuse de boire, ne mouille plus ses couches.
- **IDE injoignable** : médecin d'astreinte ; signe de gravité : **15**.

Je surveille et je trace

- Chaque selle (heure, aspect), boissons, urines, T°, IDE prévenue.
- Lister les cas : **5 cas en 4 jours = signalement** (« Épidémie d'IRA ou de GEA en ESMS »).

À retenir : Dès le premier cas : précautions contact et hygiène des mains. Le danger, c'est la déshydratation, surtout chez la personne âgée et l'enfant.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road — Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : ARS IDF/SGGIF, 20 fiches urgence EHPAD (2016) ; ASSURE IDF, fiche Diarrhées (2023) ; ARS ARA, procédure GEA en ESMS (09/2025) ; fiche socle DOTR Épidémie d'IRA ou de GEA en ESMS (10/2026) ; arrêté du 26/06/2026 (actes AS/AP/AES).

Réf. DOTR-AS-DIARR | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature