Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Épistaxis

Adulte et enfant · hors traumatisme grave du visage

15 IMMÉDIAT · saignement **abondant** ou qui coule dans la gorge malgré la compression ; **> 20 min** malgré 2 compressions, IDE non joignable ; malaise, pâleur, sueurs, gêne respiratoire, pouls > 120/min, PAS < 100 mmHg ; choc violent au visage ou à la tête.

J'applique si

- Saignement de nez, spontané ou après un petit choc.

Je ne fais pas

- Pencher la tête **en arrière** ou allonger à plat.
- Relâcher pour « vérifier » avant les 10 min.
- Coton, mèche ou produit dans le nez (geste IDE).
- Donner un médicament sans avis de l'IDE.

J'agis

TOUT DE SUITE

1. Gants. **Assis, tête penchée en avant**, haricot ou serviette ; ne peut pas s'asseoir : sur le côté, tête relevée.
2. Faire **moucher** doucement (caillots) ; **cracher** le sang de la gorge, ne pas l'avaler.
3. **Comprimer les deux narines** (partie molle) **10 min sans relâcher**, montre en main.
4. Heure de début, abondance ; **anticoagulant, antiagrégant** ? Pouls, TA ; pâleur, sueurs ?
5. Saigne encore à 10 min : remoucher, **2e compression de 10 min**, prévenir l'IDE.

ENSUITE

6. Arrêt : repos au calme ; pas de mouchage fort ni d'effort dans les heures qui suivent.
7. Enfant : rester avec lui, le rassurer ; parents selon le PAI.

Repères

Compression
10 min

- sans relâcher, 2 fois au plus

15 si
> 20 min

- ou abondant, coule dans la gorge

J'appelle l'IDE sans délai

- Reprend après la 1re compression ; **anticoagulant ou antiagrégant**, même si arrêté.
- Épistaxis à répétition ; TA élevée (PAS > 200 mmHg = signe de gravité).
- Choc sur le nez : voir aussi « Traumatisme crânien ».
- **IDE injoignable** : médecin d'astreinte ; signe de gravité : **15**.

Je surveille et je trace

- Heure, durée, côté, abondance, compressions, paramètres, qui a été prévenu.
- Récidive dans les heures ou jours suivants → IDE.

À retenir : Assis, tête en avant, mouchage puis compression des deux narines 10 min sans relâcher. Plus de 20 min ou abondant = 15 si l'IDE n'est pas là tout de suite.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : SFORL, recommandations Épistaxis de l'adulte (Ann Fr ORL 2017;134), citées par La Revue du Praticien ; ARS IDF/SGGIF, fiches urgence EHPAD, Épistaxis (2016) ; ARS IDF/STARAQS, ESMS handicap, Épistaxis (2023) ; arrêté du 26/06/2026 (actes AS/AP/AES).

Réf. DOTR-AS-EPIST | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature