Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Hémorragie externe

Tout public · vigilance sous anticoagulant ou antiagrégant

15 IMMÉDIAT · saignement **abondant** (jet, linge imbibé en quelques minutes) ou qui ne s'arrête pas malgré la compression ; pâleur, sueurs, froid, malaise, somnolence ; **garrot posé** ; vomissement de sang, sang rouge abondant dans les selles.

J'applique si

- Saignement abondant ou qui ne s'arrête pas : plaie, varice, ulcère de jambe.
- Saignement de nez : protocole « Épistaxis ».

Je ne fais pas

- Relâcher la compression pour « voir si ça saigne encore ».
- Garrot élastique de prise de sang ; garrot ailleurs que sur un bras ou une jambe.
- Desserrer ou retirer un garrot **sans avis médical**.
- Faire boire ou manger ; nettoyer longuement une plaie qui saigne beaucoup.

Je comprime ; garrot si échec

TOUT DE SUITE

1. **Gants** ; un collègue appelle le 15 si c'est abondant.
2. **Appuyer fort** sur la plaie (compresses, linge propre), sans relâcher, **jusqu'au relais**.
3. **Allonger** (lit, sol) et couvrir. Objet planté : **ne pas le retirer**.
4. Ça traverse : **reprendre la compression** par-dessus ; pansement compressif seulement si arrêté.
5. Membre, compression **inefficace ou impossible** : **garrot** 5 à 7 cm au-dessus, hors articulation.
6. Garrot industriel, sinon lien large non élastique ; **noter l'heure de pose**.
7. Pouls, TA, conscience ; **anticoagulant ou antiagrégant** (Kardégic, Plavix, Eliquis, Xarelto, AVK…) ?

J'appelle l'IDE sans délai

- Tout saignement **sous anticoagulant ou antiagrégant**, même arrêté.
- Plaie profonde, béante, du visage ou de la main.
- Saignements inhabituels sous anticoagulant : urines, gencives, bleus.
- **IDE injoignable** : médecin d'astreinte ; signe de gravité : **15**.

Je surveille et je trace

- En continu jusqu'aux secours : conscience, pâleur, sueurs, reprise du saignement.
- Heure, siège, abondance, gestes, **heure du garrot**, qui a été prévenu.
- Arrêté : protocole « Plaie simple » ; l'IDE juge s'il faut une suture.

À retenir : Comprimer fort, sans relâcher. Sur un membre, si la compression échoue : garrot, heure notée, jamais retiré sans avis médical.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : DGSCGC, recommandations PSC1 : hémorragies externes, compression directe, garrot (12/2023) ; ERC Guidelines 2025 First Aid (Resuscitation 2025;215) ; Resuscitation Council UK, First Aid Guidelines (27/10/2025).

Réf. DOTR-AS-HEMO | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature