Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Hypoglycémie

Diabétique adulte ou enfant · le PAI ou le protocole individuel prime

15 IMMÉDIAT · ne répond pas ou répond mal ; convulsion ; **ne peut pas avaler** (rien par la bouche, PLS) ; toujours < 0,70 g/L **après 2 resucrages** ; < 0,70 g/L non corrigée et IDE non joignable tout de suite.

J'applique si

- Diabétique : glycémie capillaire **< 0,70 g/L** (ou seuil du PAI).
- Ou malaise : sueurs, pâleur, tremblements, faim, agitation, confusion, changement de comportement.

Je ne fais pas

- Sucre ou boisson si la personne **répond mal ou avale mal**.
- Injecter du glucagon : **geste de l'IDE**.
- Donner le traitement du diabète de l'heure (comprimés) sans avis de l'IDE.

J'agis

TOUT DE SUITE

1. Asseoir ou allonger, rester auprès. **PAI ou protocole individuel** : l'appliquer.
2. **Glycémie capillaire** (AS/AP) sans retarder le sucre ; mesure impossible et signes typiques : resucrer.
3. Avale bien : **15 g de sucre** (carte) ; déglutition difficile : gel ou sirop gélifié **selon prescription**.
4. Somnolent, confus ou avale mal : **rien par la bouche**, PLS, **15**.
5. **Recontrôle à 15 min** : toujours < 0,70 g/L → 2e resucrage et IDE sans délai.

ENSUITE

6. Corrigée : **collation** (pain, biscuits) si le repas est à plus d'1 h, sinon le repas.
7. Noter le traitement : insuline ? **gliclazide (Diamicron), glimépiride (Amarel), répaglinide (Novonorm)** ?

Resucrage

Adulte qui avale bien

15 g de sucre

- 3 morceaux n° 4
- ou 15 cL de jus ou de soda non light

Enfant

Quantité du **PAI**

Recontrôle

à 15 min

J'appelle l'IDE sans délai

- **Toute** hypoglycémie, même corrigée (traitement à revoir).
- Sous **sulfamide ou glinide** : récidive prolongée possible.
- Non diabétique ; glycémie > 3 g/L ; vomissements, refus de manger, repas sauté.
- **IDE injoignable** : médecin d'astreinte ; signe de gravité : **15**.

Je surveille et je trace

- Heure, glycémies, signes, sucre donné (quantité), résultat, IDE prévenue.
- Contrôle au délai fixé par l'IDE : **récidive possible pendant plusieurs heures**.
- Hypoglycémies répétées : le signaler au médecin (DOTR).

À retenir : Avale bien : sucre d'abord, glycémie à 15 min. Sinon : rien par la bouche, PLS, 15. Le glucagon est un geste de l'IDE.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road — Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : Fédération française des diabétiques, hypoglycémie (2024) ; Diabète Québec, dépliant hypoglycémie (11/2025) ; ARS IDF/STARAQS, fiche Hypoglycémie (2023) ; ASSURE IDF (2023) ; OMéDIT IDF/ARS IDF, PECM ESMS handicap (2025) ; arrêté du 26/06/2026 (art. 2 B).

Réf. DOTR-AS-HYPOG | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature