Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Paracétamol – Douleur et/ou fièvre

Adulte de 50 kg ou plus · paracétamol per os prescrit « si besoin » · validation de l'IDE à chaque prise

15 IMMÉDIAT · ne répond pas normalement, respire mal, convulsion, douleur thoracique, fièvre avec purpura ; **plusieurs doses par erreur** ou surdosage suspecté : 15 **sans attendre de symptôme** ; fièvre avec marbrures, confusion ou FR > 25/min, IDE injoignable.

J'applique si

- Prescription nominative « si besoin » : indication, dose, délai, maximum / 24 h, durée.
- Douleur (EN, Algoplus…) ou T° notée **avant** la prise ; pas d'allergie connue.

Je ne fais pas

- Donner du paracétamol **de sa propre initiative**, même « pour un simple mal de tête ».
- Écraser, couper, préparer une dose ; prendre le stock d'un autre résident.
- Enfant ou adulte **de moins de 50 kg** : prescription individuelle.
- Douleur intense, inhabituelle, thoracique ou abdominale : appeler, ne pas donner.

J'agis

TOUT DE SUITE

1. Somnolent, avale mal, vomit : **rien par la bouche**, appeler l'IDE.
2. **Cumul des 24 h** : dernière prise ; autres médicaments contenant du paracétamol (Ixprim, Lamaline, Izalgi, codéinés…).
3. **Avant chaque prise : appeler l'IDE** (à défaut : médecin d'astreinte), qui valide ou non.
4. Personne n'est joignable : **pas de paracétamol** ; doute : 15.

APRÈS ACCORD DE L'IDE OU DU MÉDECIN

5. Aide à la prise **(AS/AP)** de la forme prescrite (comprimé, sachet, effervescent).
6. Éducateur, AES : aide à la prise après **validation explicite** de l'IDE ou du médecin (L.313-26 CASF).

ENSUITE

7. Fièvre : découvrir, faire boire (« Hyperthermie ») ; douleur : « Douleur ».

Schéma DOTR

1 g par prise

6 h minimum entre 2 prises

3 g / 24 h maximum

Durée, puis avis médical

- **3 jours** si fièvre
- **5 jours** si douleur

J'appelle l'IDE sans délai

- Douleur ou fièvre non soulagée après la prise ; dose maximale atteinte et besoin persistant.
- Vomissements, éruption cutanée, jaunisse après la prise.
- **IDE injoignable** : médecin d'astreinte ; signe de gravité : **15**.

Je surveille et je trace

- Heure, dose, motif, score ou T° avant, **qui a validé, à quelle heure**, **cumul 24 h**.
- Recontrôler T° ou douleur **au délai fixé par l'IDE** ; tracer l'effet.
- Besoin chaque jour : le signaler pour réévaluation médicale (DOTR).

À retenir : Pas de « si besoin » sur sa seule appréciation : validation de l'IDE ou du médecin à chaque prise (protocole DOTR « Aide à la prise des traitements si besoin »). Additionner tout le paracétamol des 24 h.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road — Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : RCP Doliprane 1000 mg (ANSM, MAJ 25/08/2025) ; L.313-26 CASF ; TA Dijon, 25/01/2024, n° 2000998 ; CAA Lyon (commentée 02/2026) ; arrêté du 26/06/2026 (art. 2 B II) ; OMéDIT IDF/ARS IDF, PECM en ESMS handicap (2025).

Réf. DOTR-AS-PARA | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature