Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Perte de connaissance / Malaise

Adulte et enfant (IME) · malaise, perte de connaissance brève, personne retrouvée inconsciente qui respire

15 IMMÉDIAT · ne respire pas normalement (→ RCP) ; ne se réveille pas, reste confus ou somnolent ; douleur thoracique, essoufflement ; signes d'AVC même régressifs ; convulsion > 5 min ; chiffre du niveau 2 (« Fiche 0 ») et **IDE non joignable** tout de suite.

J'applique si

- Malaise, perte de connaissance brève, ou personne retrouvée inconsciente.
- Ne répond pas : respiration vérifiée **10 s** ; anormale → « Arrêt cardio-respiratoire ».

Je ne fais pas

- Faire boire, manger ou prendre un médicament s'il est somnolent ou avale mal.
- Le laisser seul, même après récupération.
- Le relever d'un coup ou le faire marcher tout de suite.
- **PLS après une chute** avec douleur du cou ou du dos.

J'agis

TOUT DE SUITE

1. Inconscient qui respire : **PLS** (enceinte, obèse : **côté gauche**). Conscient : **allongé** (assis s'il respire mal).
2. Après une chute : pas de PLS ; s'il vomit, sur le côté, tête-cou-tronc alignés.
3. Desserrer, couvrir, rassurer ; rester auprès. **PAI** (épilepsie, diabète) : l'appliquer.
4. Pouls, **TA aux deux bras**, SpO2, FR, T° ; **glycémie** (AS/AP) : < 0,70 g/L → « Hypoglycémie ».
5. Douleur thoracique, essoufflement, palpitations ? **Visage, bras, parole** (AVC) ?
6. Circonstances : lever, effort, repas, toux, nouveau médicament ; choc à la tête ?
7. Prévenir l'IDE : elle fait l'**ECG**, transmis au médecin.

APRÈS ACCORD DE L'IDE OU DU MÉDECIN

8. Récupéré : rester allongé, recontrôler TA et pouls ; relever **progressivement, à deux**.

J'appelle l'IDE sans délai

- Tout malaise, **même récupéré** : ECG par l'IDE, avis médical.
- Chiffre du niveau 2 (« Fiche 0 ») : **sans délai**.
- Malaises répétés, traitement récemment modifié, chute associée.
- **IDE injoignable** : médecin d'astreinte ; signe de gravité : **15**.

Je surveille et je trace

- Recontrôler conscience, TA, pouls ; tout changement → IDE ou 15.
- Heure, durée, circonstances, paramètres, glycémie, récupération, qui a été prévenu.
- Chute : « Chute » ; choc à la tête : « Traumatisme crânien ».

À retenir : Inconscient + respiration anormale = arrêt cardiaque : RCP et DSA. Un malaise qui récupère n'est pas banal : glycémie, paramètres, IDE.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : DGSCGC, recommandations PSC1 : malaises, perte de connaissance, PLS (12/2023) ; ERC Guidelines 2025 First Aid et Adult BLS (Resuscitation 2025;215) ; ARS IDF/SGGIF, fiche « perte de connaissance » (2016) ; arrêté du 26/06/2026 (ECG : rôle propre IDE ; glycémie : AS/AP).

Réf. DOTR-AS-MALAISE | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature