Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Plaie simple

Adulte et enfant · éraflure, coupure, déchirure superficielle (dont peau fragile de la personne âgée)

15 IMMÉDIAT · saignement abondant ou en jet non arrêté par une compression continue bien faite ; malaise ; plaie profonde du cou, du thorax ou du ventre ; plaie profonde avec membre froid, pâle ou qui ne bouge plus ; pâleur, sueurs, pouls > 120/min, PAS < 100 mmHg et IDE injoignable.

J'applique si

- Plaie superficielle ; elle saigne peu ou s'arrête à la compression.

Je ne fais pas

- Antiseptique systématique : **eau et savon suffisent** pour une plaie simple.
- Couper ou arracher un lambeau de peau ; retirer un corps étranger enfoncé.
- Fermer la plaie (strips, colle) : décision et geste de l'IDE.
- Coton, poudre, crème ou pommade non prescrite.

J'agis

TOUT DE SUITE

1. Hygiène des mains, gants ; assis ou allongé.
2. Saignement : **comprimer** (compresse propre) sans relâcher, jusqu'à l'arrêt.
3. Lambeau de peau : **ne pas arracher**, laisser en place.
4. Où ? Taille ? Profonde (bords écartés, graisse visible) ? Bouge-t-il normalement doigts et membre ?
5. Comment ? Chute, objet, **morsure** ? Terre, rouille, corps étranger ? **Anticoagulant, antiagrégant** ?
6. **Laver à l'eau et au savon** (ou sérum physiologique), rincer, sécher en tamponnant.
7. Pansement propre ; peau fragile : compresse et bande, **pas d'adhésif sur la peau**.

ENSUITE

8. L'IDE vérifie le **vaccin antitétanique** et décide (colle, soins, avis) ; photo via **HEALPHI** si demandé.

J'appelle l'IDE sans délai

- **Toute plaie** : l'IDE est prévenu le jour même.
- **Sans attendre** : plaie profonde, **morsure**, souillée, corps étranger ; visage ou main ; sous **anticoagulant**.
- Lambeau de peau chez la personne âgée.
- **IDE injoignable** : médecin d'astreinte ; signe de gravité : **15**.

Je surveille et je trace

- Heure, mécanisme, localisation, taille, soins faits, qui a été prévenu.
- Jours suivants : rougeur qui s'étend, chaleur, pus, fièvre, douleur qui augmente → IDE.
- Plaie après une chute : protocole « Chute ».

À retenir : Eau + savon, compression, pansement propre : c'est tout. Morsure, plaie profonde, souillée, visage, main ou anticoagulant = IDE sans attendre.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : SFMU/SFFPC/SOFCPRE/SPILF/GFRUP, RFE Plaies aiguës en structure d'urgence (2017) ; ARS IDF/SGGIF, fiches urgence EHPAD, Plaie (2016) ; ARS IDF/STARAQS, ESMS handicap, Plaie (2023) ; arrêté du 26/06/2026 (actes IDE art. 1 V, actes AS/AP/AES art. 2).

Réf. DOTR-AS-PLAIE | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature