Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Refus de traitement

Adulte, enfant, personne non communicante · refus ponctuel ou répété

15 IMMÉDIAT · toux, étouffement ou respiration bruyante pendant ou après la prise (« Fausse route ») ; trouble de conscience ; convulsion > 5 min.

J'applique si

- La personne **refuse, recrache ou repousse** son traitement.

Je ne fais pas

- **Forcer**, maintenir la personne, ouvrir la bouche de force.
- **Dissimuler** le médicament dans un aliment ou une boisson sans **décision médicale tracée**.
- **Écraser** un comprimé, ouvrir une gélule (gestes IDE, après validation médicale ou pharmaceutique).
- Tracer « pris » une dose refusée ou recrachée.

J'agis

TOUT DE SUITE

1. **Ne pas forcer** : arrêter, rester calme, expliquer à quoi il sert ; reprendre plus tard.
2. Garder la dose refusée à part, identifiée, pour l'IDE.
3. **Pourquoi ?** goût, taille, douleur à avaler, nausées, effet indésirable, peur, moment mal choisi.
4. **Déglutition** ? toux, bavage, comprimé gardé en bouche ; douleur, fièvre ? Non communicant : Algoplus, GED-DI.
5. Médicament **critique** (carte) ? Prévenir l'**IDE** (autre forme, autre horaire).

APRÈS ACCORD DE L'IDE OU DU MÉDECIN

6. Réessayer plus tard, avec un autre professionnel, dans le délai indiqué par l'IDE.

ENSUITE

7. Enfant : parents selon le PAI.

Critiques

Avis rapide, nuit comprise

- antiépileptique
- insuline
- anticoagulant
- antiparkinsonien
- corticoïde

J'appelle l'IDE sans délai

- Refus d'un **médicament critique** : avis rapide, la nuit aussi.
- Refus répété, de tous les traitements, ou de manger et de boire.
- Douleur à la déglutition, toux à chaque prise, comportement inhabituel.
- **IDE injoignable** : médecin d'astreinte ; signe de gravité : **15**.

Je surveille et je trace

- Médicament, heure, refus total, partiel ou recraché, raison, qui a été prévenu.
- Effets de la dose non prise (crise, glycémie, douleur, agitation).
- Refus répétés : l'IDE informe le médecin pour réévaluer le traitement.

À retenir : Le refus se respecte, se comprend et se trace. On ne force pas ; on ne cache pas un médicament dans l'alimentation sans décision médicale écrite.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : CSP L1111-4 (droit de refuser un traitement) ; CASF L311-3 (consentement) et L313-26 ; HAS, Outils de sécurisation de l'administration des médicaments (2011) ; OMéDIT Centre-Val de Loire, Aide à la prise / administration (07/2023) ; arrêté du 26/06/2026, art. 2.

Réf. DOTR-AS-REFUS | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature